

ເອກະສານກຳກັບຢາ

ALITADA

ຊື່ທົດໄປ: Tadalafil

ຊື່ການຄ້າ: ALITADA

ສ່ວນປະກອບ:

Tadalafil.....20mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ຊ່ວຍບັນເທົາ ອາການຫຼັງໄວ ໃນຜູ້ຊາຍ
- ຊ່ວຍບັນເທົາ ອາການເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດທີ່ເກີດຈາກຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່ ໃນເພດຊາຍ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ເພດຊາຍໂດຍສະເພາະ, ໃຊ້ກິນ ໂດຍກິນ 1 ເມັດ ວັນລະຄັ້ງ, ກິນກ່ອນ 30 ນາທີ ກ່ອນຈະມີເພດສຳພັນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານກໍໄດ້, ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມກິນຢານີ ເມື່ອພົບວ່າ ມີອາການແພ້ຕ່ຳຕົວຢາ ຫຼືສ່ວນປະກອບຂອງຢານີມາກ່ອນ.
- ເມື່ອຢູ່ໃນສະພາວະຂ້າງລຸ່ມ ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຢານີ ເຊັ່ນ:
 - ເປັນໂລກຫົວໃຈ ທີ່ກຳລັງປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ໃນໝວດ Nitrates.
 - ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມດັນ, ມີຄວາມດັນເລືອດໃນປອດສູງ ກຳລັງໃຊ້ຢາໃນກຸ່ມ Riociguat ຫຼື ກຸ່ມ Alpha-blockers
 - ມີບັນຫາກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕາຍ, ຄວາມດັນສູງ, ຄວາມດັນຕ່ຳ.
 - ມີບັນຫາກ່ຽວກັບໂລກຫົວໃຈ, ບັນຫາກ່ຽວກັບເລືອດ, ມີບັນຫາກ່ຽວກັບມະເຮັງ.
 - ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕັບ, ໄຂ່ຫຼັງ, ຄວນປຶກສາແພດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການແນະນຳສະເພາະເນື່ອງຈາກປະຕິກິລິຍາປະລະປັກຂອງຢາຂຶ້ນກັບສະພາບອາການ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

ຄຳເຕືອນ:

- ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຢານີ ເພື່ອເປັນການປິ່ນປົວການເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ, ບໍ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ, ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການກ່ຽວກັບໂລກຫົວໃຈ ຖ້າໄດ້ນຳໃຊ້ຢານີ ໃຫ້ຢຸດກິດຈະກຳທາງເພດ ຫຼັກເວັ້ນການມີເພດສຳພັນ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າປິ່ນປົວອາການທີ່ສຳພັນກັບໂລກຫົວໃຈກັບແພດໂດຍດ່ວນ.
- ຖ້ານຳໃຊ້ຢານີ ແລ້ວເກີດມີອາການແໜ້ນໜ້າເອິກ ໃຫ້ເຂົ້າພິດແພດເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວທັນທີ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການທີ່ມັກພົບ ອ່ອນເພຍ, ໜ້າບວມ, ເມື່ອຍໝົດແຮງ, ເຈັບປວດ.
- ມີບັນຫາຕ່ຳຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ເຈັບໜ້າເອິກ, ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ, ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕາຍ, ມີສະພາບຫົວໃຈສັ່ນ, ເປັນລົມ ຫມົດສະຕິ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ.
- ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຂັບຍ່ອຍລະລາຍອາຫານ ກວດພົບໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບຜິດປົກກະຕິ, ປາກແຫ້ງ, ກິນລຳບາກ ຫຼອດອາຫານອັກເສບ, ກະເພາະອັກເສບ, ກວດພົບ Elevated r-glutamyl transferase (GGTP) ໃນເລືອດສູງ, ຖ່າຍແຫຼວ, ປຸ້ນທ້ອງ, ປວດທ້ອງ, ຮາກ.
- ບັນຫາກ້າມເນື້ອ ແລະ ກະດູກ: ປວດຂີ້, ປວດກະດູກ.
- ມີບັນຫາທາງປະສາດ: ວິນຫົວ, ໝົດສະຕິ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ສະລິມສະລີ, ວິນວຽນ
- ບັນຫາກ່ຽວກັບການຫາຍໃຈ: ຫາຍໃຈລຳບາກ, ເລືອດຕັ້ງອອກ, ອັກເສບ.
- ບັນຫາກ່ຽວກັບຜິວໜັງ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ: ຄັນ, ເປັນຜືນ, ອອກເຫືອ.
- ບັນຫາກ່ຽວກັບຕາມືວ, ມີບັນຫາໃນການໄຈ້ແຍກສີ, ເຫຍື້ອເມື່ອກຕາອັກເສບ, ປວດຕາ, ນ້ຳຕາໄຫຼຫຼາຍຂຶ້ນ, ເປືອກຕາບວມ.
- ບັນຫາກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນ: ສູນເສຍການໄດ້ຍິນທັນທີທັນໃດ, ຫຼືອີ.
- ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວຍະວະ: ເກີດການແຂງຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ແຂງຕົວຜິດປົກກະຕິ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີມ້ວງ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດການບັນຈຸ: 2 ເມັດ/ກັບ

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີ່ເຢັນແລະແຫ້ງພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ 30°C ເພື່ອປ້ອງກັນຈາກແສງແດດ
- ເກັບໄວ້ຫ່າງໄກຈາກເດັກນ້ອຍ

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ໝາຍເຫດ: ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີສັບພະຄຸນໃນການປົກປ້ອງ, ປິ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້

ALITADA

Generic name: Tadalafil

Brand name: ALITADA

Composition:

Tadalafil20mg

Indications:

- Relieves erectile dysfunction.
- Relief of signs and symptoms of erectile dysfunction with benign prostatic hyperplasia.

Dosage:

- Oral, for adult males, once a day, 1 tablet each time. Take it at least 30 minutes before sex, regardless of food intake. It is best not to take it continuously every day.

Contraindications:

- Do not take this medicine if you are allergic to it or any of its components.
- This medicine should not be used in the following conditions:
 - Patients with heart disease currently being treated with nitrates.
 - Patients with blood pressure disorders or pulmonary hypertension who are taking medications such as Riociguat or alpha-blockers.
 - Patients with a history of myocardial infarction, hypertension, or hypotension.
 - Patients with cardiovascular diseases, blood disorders, or cancer-related conditions.
 - Patients with liver or kidney disorders should consult a physician for individual risk assessment due to potential drug interactions.

Warning:

- The treatment of erectile dysfunction, including tadalafil tablets, should not be used for men whose pre-existing cardiovascular conditions do not recommend sexual behavior. Patients who develop symptoms at the onset of sexual activity should be advised to abstain from sexual activity and seek immediate medical attention.
- Patients who develop angina pectoris after taking tadalafil tablets should seek medical treatment immediately.

Adverse Effects:

- General—weakness, facial edema, fatigue, pain
- Cardiovascular - angina, chest pain, hypotension, myocardial infarction, orthostatic hypotension, palpitations, syncope, tachycardia
- Digestion—abnormal liver function tests, dry mouth, dysphagia, esophagitis, gastritis, elevated r-glutamyl transferase (GGTP), loose stools, nausea, epigastric pain, vomiting
- Musculoskeletal - joint pain, neck pain
- Nervous—dizziness, hypoesthesia, insomnia, paresthesia, drowsiness, vertigo
- Breathing – dyspnea, epistaxis, pharyngitis
- Skin and appendages - itching, rash, sweating
- Eyes - Blurred vision, altered color vision, conjunctivitis (including conjunctival injection), eye pain, increased lacrimation, eyelid swelling
- Ears - Sudden hearing loss or loss, ringing in the ears
- Urogenital – increased erections, spontaneous penile priapism

Dosage form: Purple tablets

Expiry date: 36 months from the date of manufacture

Packaging: 2 Tablets/box

Storage:

- Store in a cool and dry place below 30°C protect from light.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

Note: This product is not effective in diagnosing, treating or preventing diseases.