

ALIUPATINIB

Generic name: Upadacitinib extended-release

Brand Name: ALIUPATINIB

Composition: Upadacitinib.....15mg

Indications:

- Adults who have had an inadequate response or intolerance to one or more TNF blockers having the following conditions:
 - Moderate to severe active rheumatoid arthritis.
 - Active psoriatic arthritis.
 - Moderate to severe ulcerative colitis.
 - Moderate to severe Crohn's disease.
 - Active ankylosing spondylitis.
 - Active non-radiographic axial spondylarthritis.
- Adults and pediatric patients 12 years of age and older with refractory, moderate to severe atopic dermatitis whose disease is not adequately controlled with other systemic drug products, including biologics, or when use of those therapies is inadvisable.

Dosage:

- Use under the guidance of a physician.

Contraindications:

- Allergies to the active ingredient or any excipients of this product, active tuberculosis, active severe bacterial infection, severe liver function impairment, pregnant women: contraception should be used during medication.

Warning:

- Severe infection: Avoid use in patients with active severe infection, including local infection.
- Gastrointestinal (GI) perforation.
- It is recommended to monitor changes in lymphocytes, neutrophils, hemoglobin, liver enzymes and lipids.
- Lactating women should stop breastfeeding during medication.
- Vaccination: Avoid using with live vaccines.

Adverse Effects:

Upper respiratory tract infection, herpes zoster, herpes simplex, bronchitis, nausea, cough, fever, acne, headache, allergy, folliculitis, nausea, abdominal pain, increased blood creatine.

Dosage form: Purple tablets.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 28 Tablets/bottle.

Storage:

- Protected from light, sealed in original packaging, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIUPATINIB

ຊື່ທົດໄປ: Upadacitinib extended-release

ຊື່ການຄ້າ: ALIUPATINIB

ສ່ວນປະກອບ: Upadacitinib.....15mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີການຕອບສະໜອງບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ມີການທົດສອບທີ່ບໍ່ສາມາດທົນທານໄດ້ຕໍ່ຢາຕ້ານ TNF ແລະ ມີອາການພະຍາດດັງຕໍ່ໄປນີ້:
 - ພະຍາດຂັອກເສບທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງປານກາງ ຫາ ສູງ.
 - ພະຍາດຂັອກເສບ psoriatic.
 - ພະຍາດລຳໄສ້ເປັນແຜປານກາງ ຫາ ຮຸນແຮງ.
 - ພະຍາດ Crohn ທີ່ມີອາການປານກາງ ຫາ ຮຸນແຮງ.
 - ພະຍາດຂັອກເສບກະດູກສະຫຼັງຕິງ.
 - ພະຍາດອັກເສບກະດູກສັນຫຼັງແກນກາງທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ວຍການສ່ອງໄຟຟ້າ.
- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 12 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ເປັນພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຈາກພູມແຜ່ປານກາງ ຫາ ຮຸນແຮງທີ່ມີການຕີຢາ, ເຊິ່ງພະຍາດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເໝາະສົມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທາງການແພດອື່ນໆ, ລວມເຖິງຢາທາງກຸ່ມຊີວະພາບທີ່ເມື່ອນຳໃຊ້ການບຳປັດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ແນະນຳໃຫ້ນຳໃຊ້ຢານີ້.

ວິທີໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແຜ່ຕໍ່ຜິວຢາຫຼືສ່ວນປະກອບໃດໆໃນຜະລິດຕະພັນນີ້, ຄົນເຈັບທີ່ເປັນວັນນະໂລກ, ຄົນເຈັບທີ່ຍັງມີການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ຮຸນແຮງ, ການທຳການຂອງຕັບບິກພ່ອງຢ່າງຮຸນແຮງ, ແມ່ຍິງຖືພາຄວນມີການວາງແຜນການຄຸມກຳເນີດລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ.

ຄຳເຕືອນ:

- ໃນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ຮ້າຍແຮງ: ບໍ່ຄວນໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອຮ້າຍແຮງ ແລະ ທັງຜູ້ຕິດເຊື້ອສະເພາະທີ່.
- ການເຈາະລະບົບທາງເດີນອາຫານ(GI)
- ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ ຄວນກວດຕິດຕາມ ຕຳລາເລືອດ ກວດລະດັບເມັດເລືອດຂາວ ເຊັ່ນ: lymphocytes, neutrophils, ຕິດຕາມກວດ hemoglobin, ເອັມໄຊຕັບ ແລະ ລະດັບໄຂມັນໃນເລືອດ.
- ຢານີ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ: ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ໃນຊ່ວງທີ່ໃຊ້ຢານີ້ ຄວນລະວັງ ງົດການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ແນະນຳໃຫ້ມີການຄຸມກຳເນີດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຢາປິ່ນປົວ.
- ຜົນກະທົບຕໍ່ການສັກວັກຊີນ: ຫຼືກເວັ້ນການສັກວັກຊີນເຊື້ອເປັນ ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອລະບົບຫາຍໃຈຊ່ວງເທິງ, ພາໃຫ້ເກີດ ພະຍາດງສະວັດ ເປັນເກັດອອກຮ້ອນ(herpes zoster, herpes simplex), ອັກເສບປອດ, ປຸ່ນທ້ອງ, ໄອ, ເປັນໄຂ້, ເປັນສິວ, ເຈັບຫົວ, ແຜ່, ອັກເສບຕາມຮູຊຸມຂົນ, ເຈັບທ້ອງ, creatine ໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີມ້ວງ.

ວັນໝົດອາຍ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການບັນຈຸມັດຫໍ່: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງ 28 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 20°C-25°C.

- ເກັບຮັກສາ ຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ
ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com