

ALIVRASDNI

Generic name: Vorasidenib Tablets

Brand Name: ALIVRASDNI

Composition:

Vorasidenib 40 mg

Indications:

- Vorasidenib is indicated for the treatment of adult and pediatric patients 12 years and older with Grade 2 astrocytoma or oligodendroglioma with a susceptible isocitrate dehydrogenase-1 (IDH1) or isocitrate dehydrogenase-2 (IDH2) mutation following surgery including biopsy, sub-total resection, or gross total resection.

Dosage:

- Recommended dosage in adults: 40 mg orally once daily.
- Recommended dosage in pediatric patients 12 years of age and older based on body weight:
 - ≥40 kg: 40 mg orally once daily.
 - <40 kg: 20 mg orally once daily.
- Take with or without food.

Contraindications:

- None.

Warning:

- Hepatotoxicity: Monitor liver function tests every 2 weeks during the first 2 months of treatment, then monthly for the first 2 years of treatment, and as clinically indicated. Withhold, reduce the dose or discontinue ALIVRASDNI based on severity.
- Embryo-Fetal Toxicity: ALIVRASDNI can cause fetal harm. Advise patients of the potential risk to a fetus and to use effective nonhormonal contraception.
- Lactation: Advise not to breastfeed
- Infertility: May impair fertility in males and females

Adverse Effects:

- The most common (≥15%) adverse reactions include fatigue, headache COVID-19, musculoskeletal pain, diarrhea, nausea, and seizure.

Dosage form: White round tablets.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 30 tablets/bottle.

Storage:

- Store at room temperature not exceeding 30°C.
- Please keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIVRASDNI

ຊື່ທົ່ວໄປ: Vorasidenib Tablets

ຊື່ການຄ້າ: ALIVRASDNI

ສ່ວນປະກອບ:

Vorasidenib 40 mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- Vorasidenib ໃຊ້ສຳລັບການປິ່ນປົວຄົນເຈັບສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກທີມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ, ທີ່ເປັນ astrocytoma ຂັ້ນ 2 ຫຼື ເນື່ອງອກ oligodendroglioma ຂັ້ນ 2 ທີ່ມີການກາຍພັນຂອງເອນໄຊມ isocitrate dehydrogenase-1 (IDH1) ຫຼື isocitrate dehydrogenase-2 (IDH2) ທີ່ໄວຕໍ່ການຜ່າຕັດ (ລວມທັງການຕັດເອົາຊິ້ນສ່ວນ, ການຕັດອອກບາງສ່ວນ ຫຼື ການຕັດອອກທັງໝົດ).

ວິທີໃຊ້:

- ປະລິມານທີ່ແນະນຳສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່: 40 mg ກິນ ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ.
- ປະລິມານທີ່ແນະນຳສຳລັບເດັກທີມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ ຂຶ້ນກັບການພິຈາລະນາຈາກນ້ຳໜັກຂອງ ຮ່າງກາຍ:
 - ≥ 40 kg: 40 mg ກິນ ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ.
 - < 40 kg: 20 mg ກິນ ມື້ລະ 1 ຄັ້ງ.
- ສາມາດກິນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານກໍໄດ້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ບໍ່ມີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຄວາມເປັນພິດຕໍ່ຕັບ (Hepatotoxicity): ກວດປະເມີນໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບທຸກໆ 2 ອາທິດໃນ ໄລຍະ 2 ເດືອນທຳອິດຂອງການປິ່ນປົວ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດທຸກໆເດືອນໃນໄລຍະ 2 ປີທຳອິດຂອງການ ປິ່ນປົວ ແລະ ຕາມການບົ່ງມະຕິທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ຫາກໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບຜິດປົກກະຕິໃຫ້ພັກ, ຫຼຸດປະລິມານຢາ ຫຼື ຢຸດການໃຊ້ຢາ ALIVRASDNI ຕາມຄວາມຮຸນແຮງ.
- ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວອ່ອນ ແລະ ເດັກໃນທ້ອງ: ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວອ່ອນ ແລະ ເດັກໃນ ທ້ອງ ຄວນໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
- ການໃຫ້ນົມລູກ: ບໍ່ແນະນຳສຳລັບແມ່ຍິງໃຫ້ນົມລູກ.
- ພາວະມີລູກຍາກ: ອາດເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບທາງເພດຫຼຸດລົງໃນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການທີ່ພົບເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ (ປະກົດການ $\geq 15\%$) ໄດ້ແກ່: ອາການອ່ອນເພຍ, ເຈັບຫົວ, ມີການ ຄ້າຍຄື COVID-19, ເຈັບປວດຕາມກ້າມຊີ້ນ ແລະ ກະດູກ, ຖອກທ້ອງ, ປວດຮາກ ແລະ ມີອາການ ຂັກ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດມົນສີຂາວ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30°C .
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຝາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com