

ALLERPLEX

Generic name: Montelukast sodium / levocetirizine Dihydrochloride

Brand name: ALLERPLEX

Composition:

Montelukast.....10mg

Levocetirizine Dihydrochloride.....5mg

Indications:

- Allergic rhinitis, seasonal rhinitis and asthma.

Dosage:

- Adults and children aged 12 and above: 1 tablet once a day.

Contraindications:

- Those who are allergic to this product.
- Individuals with impaired renal function or severe liver disease.

Warning:

- Pregnant and lactating women should use with caution.
- If you are taking Alprazolam or Codeine, use this product with caution.
- Do not operate motor vehicles such as automobiles, boats and aircraft or engage in high-altitude operations, mechanical operations, or operate precision instruments while using this product.

Adverse Effects:

- Headache, stomachache, arthralgia, fever, nausea and indigestion.

Dosage form: White tablets

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 Tablets/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Store in original packaging in a dry place (not exceeding 30 °C).
- Please keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALLERPLEX

ຊື່ທົ່ວໄປ: Montelukast sodium / levocetirizine Dihydrochloride

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALLERPLEX

ສ່ວນປະກອບ:

Montelukast.....10mg

Levocetirizine Dihydrochloride.....5mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ໃຊ້ເປັນປົວພະຍາດພູມແຜ່ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ພາໃຫ້ເກີດການອັກເສບຜິດດັງ ແລະ ພະຍາດຫີດ.

ວິທີໃຊ້:

- ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ: ນຳໃຊ້ ຄັ້ງລະ 1 ເມັດ ຕໍ່ມື້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ແພ່ຢານີ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນລະດັບເຈັບ ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການທຳງານຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຕັບຮ້າຍແຮງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຄວນໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
- ຄົນເຈັບຢູ່ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ Alprazolam ແລະ Codeine ໃຫ້ນຳໃຊ້ຢານີດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
- ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢານີ ຫ້າມຂັບຂີຍານພາຫະນະເຊັ່ນ: ຂີລົດ, ຂີເຮືອ, ຂີຍົນ, ຫ້າມເຮັດວຽກທີ່ມີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືກົນຈັກ, ຫຼືກວດກາເຮັດວຽກໃນທີ່ສູງ.

ຜົນຂ້າງຄວາມ:

- ເຈັບຫົວ, ເຈັບຫ້ອງ, ປວດຕາມຂໍ້ກະຕຸກ, ມີອາການໄຂ້, ປຸ້ນຫ້ອງ, ແລະ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນໝົດອາຍຸ : 36 ເດືອນຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບ ມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາຢາໄວ້ໃນກັບກ່ອງເຕີມ, ປິດສະໝິດ, ໃນພື້ນທີ່ແຫ້ງ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30 °C
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com