

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALLIHYZAAR

ຊື່ທົວໄປ: Losartan/Hydrochlorothiazide

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALLIHYZAAR

ສ່ວນປະກອບ:

Losartan.....50mg

Hydrochlorothiazide.....12.5mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ໃຊ້ເປັນຢາປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ເພາະສຳລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາປະສົມ.

ວິທີໃຊ້:

- ກິນວັນລະຄັ້ງ, ຄັ້ງລະເມັດ (50mg/12.5mg) ແລະ ສາມາດເພີ່ມປະລິມານໄດ້ຫຼັງ 3 ອາທິດ, ຂັ້ນຕໍ່າເປັນ 2 ເມັດຕໍ່ວັນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ບໍ່ຄວນໃຊ້ໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນພະຍາດ: ລະດັບໂລແຫດຊຽມໃນເລືອດສູງ, ຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ, ຕັບມີບັນຫາ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງມີບັນຫາເລັກໜ້ອຍ-ລະດັບປານກາງ, ຍິງຖືພາ ຫຼື ປະລິມານເລືອດຫຼຸດລົງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຫ້າມໃຊ້ຢາກັບແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ແມ່ໃນໄລຍະໃຫ້ນ້ຳນົມລູກ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ພະຍາດປະດິງ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ຫຼັງຜ່າຕັດ sympathectomy ຫຼື ສາຍຕາສັນກະທັນຫັນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາດຈະມີອາການວິນຫົວເລັກໜ້ອຍ, ປວດຫ້ອງ, ປວດຫຼັງ, ເມືອຍລ້າ, ຜິວໜັງເປັນຜືນ, ນ້ຳມູກໄຫຼ ຫຼື ຄັນດັງ, ເຈັບຄໍ ຫຼື ໄອແຫ້ງ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີເຫຼືອງ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງ ມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບໄວ້ບ່ອນບໍ່ມີແສງແດດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ 25°C, ເກັບໄວ້ຫ່າງໄກຈາກເຕັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຝາກມາ ກຽບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ALLIHYZAAR

Generic name: Losartan/Hydrochlorothiazide

Brand name: ALLIHYZAAR

Composition:

Losartan.....50mg

Hydrochlorothiazide.....12.5mg

Indications:

- A combination medication used to treat high blood pressure when Losartan alone is insufficient.

Dosage:

- Starting dose is 1 tablet (50mg/12.5mg) once daily and can be increased after a minimum of 3 weeks to 2 tablets once daily.

Contraindications:

- Patients with: high levels of potassium in the blood, renal artery stenosis, low blood pressure, liver problems, mild to moderate kidney impairment, pregnancy or decreased blood volume.

Warnings:

- Do not take if pregnant or breast feeding.
- Do not take if patient has: hepatic impairment, renal impairment, gout, diabetes, post-sympathectomy or acute myopia.

Adverse effects:

- Dizziness or lightheadedness, stomach pain, fatigue, skin rash, runny or stuffy nose, sore throat or dry cough.

Dosage form: Yellow tablet.

Expiry date: 24 months after date of manufacture.

Packaging: Contained in 50 blister packs, 10 tablets per blister pack.

Storage:

- Store under 25°C, protected from moisture and direct sunlight away from children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com