

ALLIPAINIX

Generic name: Pregabalin - mecobalamin compound.

Proprietary Name: ALLIPAINIX

Composition:

Pregabalin.....75mg

Mecobalamin.....0.5mg

Indications:

- This product is indicated in the treatment of neuropathic pain, such as postherpetic neuralgia, peripheral neuropathy and fibromyalgia.

Dosage:

- Take one capsule after meals, twice a day.

Contraindications:

- This product is contraindicated in patients with suicidal ideation, heart failure, depression or glaucoma.
- Patients with allergies to any component of this product.

Warning:

- Pregnant and lactating women should use with caution.
- If you are taking Captopril, Lorazepam, Pentazocine or Codeine, use this product with caution.
- While using this medication patients should not operate motor vehicles, boats, aircraft or use precision instruments.

Adverse Effects:

- Constipation, flatulence, vomiting, and weight gain.

Dosage form: Red capsule.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 Capsules/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Protected from light, sealed in original packaging, and stored at 20 - 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALLIPAINIX

ຊື່ທົ່ວໄປ: Pregabalin- mecobalamin compound.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALLIPAINIX

ສ່ວນປະກອບ:

Pregabalin.....75mg

Mecobalamin.....0.5mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

- ຢາມີເຫມາະສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວເສັ້ນປະສາດ ເຊັ່ນ: ປາຍປະສາດອັກເສບ (ພະຍາດປະສາດສະວັດ), ເຈັບປວດຕາມປາຍປະສາດ, ຕາມປາຍມື, ແຂນຂາ, ພະຍາດປະສາດ Fibromyalgia ເປັນຕົ້ນ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ກິນຄັ້ງລະແຄ້ບຊຸນ, ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ, ກິນພາຍຫລັງຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແພ້ຢາມື, ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດທາງຈິດມີທ່າອຽງໃນການຂ້າໂຕຕາຍ, ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດຫົວໃຈ, ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຊຶມເສົ້າ, ຄົນເຈັບທີ່ມີພະຍາດຄວາມດັນໃນຕາສູງ ຫລື Glaucoma.
- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການແພ້ຕ່ອງໂສ້ປະກອບໃດໆຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ຄຳເຕືອນ:

- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.
- ການໃຊ້ຢາມີ ຮ່ວມກັບ ຢາໃນກຸ່ມ Captopril, Lorazepam, Pentazocine ຫລື Codeine ອາດເກີດມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຕ້ານກັນໄດ້ ຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.
- ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ ບໍ່ຄວນຂັບຂີຍານພາຫະນະ, ເຮັດວຽກໃນທີ່ສູງ, ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຄື່ອງກົນຈັກໃດໆ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການແນະນຳຂອງແພດ ຕາມການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຢາ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ບັນດາຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບເຫັນແມ່ນມີ ສະພາບການປັ່ນປ່ວນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງຜູກ, ຫ້ອງອີດ, ຮາກ, ນ້ຳຫນັກເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາແຄ້ບຊຸນສີແດງ

ວັນຫມົດອາຍຸ : 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ແຄ້ບຊຸນ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງ ບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີ ອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com