

ALIMABALOXAVIR

Generic name: Baloxavir marboxil

Brand Name : ALIMABALOXAVIR

Composition : Baloxavir marboxil 20mg.

Indications:

- Treatment of acute uncomplicated influenza in patients 12 years of age or older who have been symptomatic for no more than 48 hours and who are otherwise healthy.
- Adults and pediatric patients 12 years of age and older who are at high risk of developing influenza-related complications.
- Post-exposure prophylaxis of influenza in patients 5 years of age and older following contact with an individual who has influenza.

Dosage:

This product should be taken as a single dose as soon as possible and within 48 hours of influenza symptom onset for treatment of acute uncomplicated influenza or following contact with an individual who has influenza.

- Patients weighing between 20kg-80kg: 40mg.
- Patients weighing ≥ 80 kg: 80mg.

Contraindications:

Allergic to any component of this product.

Warning:

- If there is a suspected allergic reaction during the medication process, stop the medication immediately and take treatment.
- This product is not suitable for patients under 5 years old.
- There is no research to prove that this product is effective against pathogens other than influenza virus. Be cautious of secondary bacterial infections.
- Pregnant and lactating women should use with caution.

Adverse Effects: Diarrhea, bronchitis, nausea, sinusitis, headache, vomiting.

Dosage form: Yellow tablets

Packaging: 2 tablets/blister pack, 1 blister pack/box.

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Storage:

- Protected from light, sealed in original packaging, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ALIMABALOXAVIR

ຊື່ທົ່ວໄປ: Baloxavir marboxil

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ALIMABALOXAVIR

ສ່ວນປະກອບ: Baloxavir marboxil 20mg.

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ນຳໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວອາການ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ທີ່ຍັງບໍ່ມີອາການສິ້ນສຸດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ບໍ່ເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງ, ໃຊ້ໃນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸເກີນກວ່າ 12 ປີຂຶ້ນໄປ.
- ໃຊ້ໃນຜູ້ໃຫຍ່, ເດັກ ອາຍຸຫລາຍກວ່າ 12 ປີ, ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ ກຳລັງຈະພັດທະນາເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທີ່ມີອາການສິ້ນ.
- ໃຊ້ປ້ອງກັນອາການໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໃນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ຫລັງຈາກທີ່ຮັບຮູ້ວ່າມີການສຳພັດກັບຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.

ວິທີໃຊ້:

ການນຳໃຊ້ຢາມີ ຄວນໃຫ້ກິນຢາທັນທີ ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ, ຫລັງຈາກຮູ້ສຶກມີອາການເປັນ ຫວັດ ຫລື ສຳພັດກັບຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເພື່ອປິ່ນປົວບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.

- ນຳໃຊ້ດ້ວຍການກິນໃນປະລິມານ 40 mg ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີນ້ຳໜັກ ລະຫວ່າງ 20 kg-80 kg.
- ໃຊ້ ປະມານ 80 mg ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີນ້ຳໜັກ 80 kg ຂຶ້ນໄປ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແພ້ຢາມີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຖ້າມີອາການແພ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ ໃຫ້ຢຸດນຳໃຊ້ ແລະ ຕິດຕາມປິ່ນປົວ ປັນດາອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- ຢາມີບໍ່ເໝາະສົມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ.
- ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອອກລິດຂອງຢາຕໍ່ເຊື້ອອື່ນ ນອກຈາກໄວ ຣັດທີ່ຊັກນຳໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ຄວນໃຫ້ການລະມັດລະວັງໃນການຕິດເຊື້ອລົດເຊື້ອອື່ນໆຕາມມາ ຫລັງການຕິດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.
- ຄວນລະມັດລະວັງ ໃນການນຳໃຊ້ຢາມີ ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍ ນ້ຳນົມແມ່.

ຜົນຂ້າງຄຽງ: ຖອກຫ້ອງ, ຫລອດລົມອັກເສບ, ວິນຫົວ, ໄຊນັດອັກເສບ, ເຈັບຫົວ, ຮາກ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີເຫລືອງ

ວັນທີຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 1 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 2 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com