

APIXA

Generic name: Apixaban tablets

Brand name: APIXA

Composition:

Apixaban.....2.5mg

Indications:

- To reduce the Risk of Stroke and Systemic Embolism in patients with nonvalvular Atrial Fibrillation.
- for the prophylaxis of deep vein thrombosis (DVT), which may lead to pulmonary embolism (PE), in patients who have undergone hip or knee replacement surgery.
- For the treatment (DVT) and (PE), and for the reduction in the risk of recurrent DVT and PE following initial therapy.

Dosage and ministration:

- Reduction of Risk of Stroke and Systemic Embolism in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation
The recommended dose for most patients is 5 mg taken orally twice daily.
The recommended dose is 2.5 mg twice daily in patients with at least three of the following characteristics:
 - age greater than or equal to 80 years
 - body weight less than or equal to 60 kg
 - serum creatinine greater than or equal to 1.5 mg/dL
- Prophylaxis of Deep Vein Thrombosis Following Hip or Knee Replacement Surgery The recommended dose of is 2.5 mg taken orally twice daily. The initial dose should be taken 12 to 24 hours after surgery.
- In patients undergoing hip replacement surgery, the recommended duration of treatment is 35days.
- In patients undergoing knee replacement surgery, the recommended duration of treatment is 12days.
- Treatment of DVT and PE The recommended dose is 10 mg taken orally twice daily for the first 7 days of therapy. After 7 days, the recommended dose is 5 mg taken orally twice daily.
- Reduction in the Risk of Recurrence of DVT and PE The recommended dose is 2.5 mg taken twice daily after at least 6 months of treatment for DVT or PE.

Contraindications:

- Patients who are allergic to the active ingredient or any excipients in the tablets.
- Patients with liver disease with coagulopathy and clinically associated bleeding risk.
- Patients with severe hepatic impairment.

Warning:

- If severe bleeding occurs, apixaban should be discontinued immediately.
- Apixaban is not recommended during pregnancy.
- Prosthetic heart valves use not recommended

Adverse Effects:

- Common adverse reactions include anemia, bleeding, bruising and nausea. Apixaban may cause an increased risk of internal bleeding in some tissues or organs, which may lead to anemia.

Dosage form: Yellow tablet

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Packaging: 2.5mg per tablet, 30 tablets per bottle.

Storage:

- Store in a dry place below 30°C protected from light.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ APIXA

ຊື່ທົວໄປ: Apixaban tablets

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: APIXA

ສ່ວນປະກອບ:

Apixaban 2.5mg

ຂໍ້ຍິງໃຊ້:

- ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງເປັນ Stroke and Systemic Embolism ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີກ້ອນເລືອດອຸດຕັນໃນຫຼອດເລືອດ ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈຫ້ອງເທິງສັ້ນ (Atrial fibrillation = AF) ທີ່ບໍ່ມີພະຍາດລົ້ນຫົວໃຈຮ່ວມນຳ.
- ນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການປ້ອງກັນການເກີດພາວະຫຼອດເລືອດດຳອຸດຕັນສ່ວນເລິກ (DVT), ເຊິ່ງອາດຈະນຳໄປສູ່ພາວະເສັ້ນເລືອດໃນປອດອຸດຕັນ (PE), ໃນຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດປ່ຽນຂໍສະໄໝ ຫຼື ຂໍເຂົ້າ.
- ນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການກັບມາເປັນຊ້າຂອງພາວະຫຼອດເລືອດດຳອຸດຕັນສ່ວນເລິກ (DVT) ແລະ ເສັ້ນເລືອດໃນປອດອຸດຕັນ (PE) ພາຍຫຼັງການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນ.

ຂະໜາດ ແລະ ວິທີໃຊ້:

- ຄົນເຈັບພະຍາດຫົວໃຈຫ້ອງເທິງສັ້ນ (AF) ທີ່ບໍ່ມີພະຍາດລົ້ນຫົວໃຈຮ່ວມນຳ
ກິນ Apixa 5mg 1 ເມັດ ເຊົ້າ-ແລງ ຄົນເຈັບພະຍາດຫົວໃຈຫ້ອງເທິງສັ້ນ (AF) ທີ່ບໍ່ມີພະຍາດລົ້ນຫົວໃຈຮ່ວມນຳ
ກິນ Apixa 5mg 1 ເມັດ ເຊົ້າ-ແລງ. ສຳລັບກຸ່ມຄົນເຈັບພິເສດທີ່ມີປັດໃຈ 3 ຢ່າງນີ້ ຄວນຫຼຸດປະລິມານຢາລົງ ກິນ Apixa 2.5mg 2 ເທື່ອ/ມື້ ເຊົ້າ-ແລງ.
 - ຄົນເຈັບອາຍຸຫຼາຍ (≥ 80 ປີ).
 - ນ້ຳໜັກໜ້ອຍກວ່າ 60 ກິໂລ.
 - ຜູ້ທີ່ມີ Serum creatinine ≥ 1.5 mg/dL.
- ໃຊ້ປ້ອງກັນການເກີດກ້ອນເລືອດອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດດຳ (DVT) ສຳຫຼັບຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດປ່ຽນຂໍສະໄໝ
ກົກຂາ ແລະ ຂໍເຂົ້າ ກິນ Apixa 2.5mg 2 ຄັ້ງ/ມື້, ເຊົ້າ-ແລງ ຄວນເລີ່ມໃຫ້ຢາຄັ້ງທຳອິດພາຍໃນ 12 ຫາ 24 ຊົ່ວໂມງ
ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຜ່າຕັດ.
- ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດປ່ຽນຂໍສະໄໝ, ໄລຍະເວລາການປິ່ນປົວທີ່ຖືກແນະນຳແມ່ນ 35 ວັນ.
- ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດປ່ຽນຂໍເຂົ້າ, ໄລຍະເວລາການປິ່ນປົວທີ່ແນະນຳແມ່ນ 12 ວັນ.
- ຄົນເຈັບ DVT ທີ່ມີກ້ອນເລືອດອຸດຕັນຢູ່ຂາ ແລະ ຄົນເຈັບ PE ທີ່ມີກ້ອນເລືອດອຸດຕັນຢູ່ປອດ ໄລຍະ 7 ມື້ທຳອິດ:
ກິນ 10mg 2 ຄັ້ງ/ມື້ ເຊົ້າ-ແລງ ຫຼັງຈາກ 7 ມື້ ກິນ 5mg 2 ຄັ້ງ/ມື້ ເຊົ້າ-ແລງ.
- ປ້ອງກັນການມາເປັນຊ້າຂອງ DVT ແລະ PE ກິນ 2.5mg 2 ຄັ້ງ/ມື້ ເຊົ້າ-ແລງ ພາຍຫຼັງການປິ່ນປົວ (DVT) ແລະ (PE) ຢ່າງຕ່ຳ 6 ເດືອນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ສຳລັບຄົນເຈັບ ທີ່ແຜ່ຢາ ຫຼື ແຜ່ສ່ວນປະກອບ ທີ່ປະສົມໃນຢານີ້ ແມ່ນຫ້າມໃຊ້.
- ຫ້າມໃຊ້ Apixaban ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການກ່ຽວກັບພະຍາດຕັບຜິດປົກກະຕິໃນການແຂ່ງຕົວຂອງເລືອດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເລືອດອອກ.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະຕັບປົກພ່ອງຮຸນແຮງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຖ້າພົບເຫັນສະພາບເລືອດໄຫຼບໍ່ຢຸດ ຫຼື ເລືອດອອກຮຸນແຮງ ໃນເວລານຳໃຊ້ຢານີ້ ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ທັນທີ.
- Apixaban ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ ໃນແມ່ຍິງຖີ່ພາ.
- ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໃນຄົນເຈັບລົ້ນຫົວໃຈຫຼັງມາ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບມີເລືອດຈາງ, ເລືອດອອກບໍ່ຢຸດ, ມີຮອຍຈຳຕາມບໍລິເວນຜິວ, ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ. Apixaban ສາມາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກໃນອົງຄະຕ່າງໆ ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປສູ່ການເກີດພະຍາດເລືອດຈາງ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີເຫຼືອງ.

ວັນທີດອກຍຸ: 36 ເດືອນນັບຈາກວັນທີຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ເມັດ 2.5mg, ບັນຈຸໃນກ້ອງ, ກ້ອງລະ 30 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີ່ເຢັນ, ແຫ້ງ, ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 30°C, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ.
- ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເດັກບໍ່ສາມາດຢືຖືງ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com