

ARIMIDEX

Generic Name: Anastrozole

Brand Name: ARIMIDEX

Composition: Anastrozole1mg

Indications:

- First-line treatment of postmenopausal women with hormone receptor-positive or hormone receptor-unknown locally advanced or metastatic breast cancer.
- Adjuvant treatment of postmenopausal women with hormone receptor-positive early breast cancer.
- Treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women with disease progression following tamoxifen therapy.

Dosage:

- Take 1 tablet (1mg) orally once daily.

Contraindications:

- Premenopausal women including pregnant or lactating women
- Patients with severe renal and/or hepatic impairment.
- Patients who are highly sensitive to anastrozole or any excipients

Warning:

- Consider risks and benefits in women with pre-existing ischemic heart disease, as increased incidences of cardiovascular events have occurred.
- Patients have reported symptoms of fatigue and depression.
- Decreases in bone mineral density may be possible, consider bone density monitoring.
- Please read the instructions carefully and use as directed by your doctor.

Adverse effects:

- Side effects of this product mainly include skin flushing, vaginal dryness, excessive hair oil secretion, gastrointestinal disorders (anorexia, nausea, vomiting and diarrhea), fatigue, depression, headache or rash, etc. Side effects are usually mild or moderate and easily tolerated by patients.
- Uterine bleeding with this product is occasionally reported, mainly in the first few weeks after patients switch from existing hormone therapy to this product. If bleeding continues, consult your physician.
- Changes in liver function (such as increased transpeptidase and alkaline phosphatase) have been reported in patients

Dosage form: White tablets

Expiry date: 36 months after the date of manufacture

Packaging: 10 tablets/blister, 10 blisters/ box

Storage:

- Protected from light, sealed in original packaging, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ARIMIDEX

ຊື່ທົວໄປ: Anastrozole

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ARIMIDEX

ສ່ວນປະກອບ: Anastrozole1mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

- ຢານີ້ນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວແມ່ຍິງໄວໜັດປະຈຳເດືອນທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ຊະນິດຮຸກຮາມສະເພາະທີ່ ທີ່ມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນໄລຍະແຜ່ກະຈາຍ ເຊິ່ງມີຕົວຮັບຮໍໂມນເປັນບວກ ທີ່ບໍ່ຮັບຮໍໂມນຕົວຮັບຮໍໂມນ.
- ນຳໃຊ້ເປັນການປິ່ນປົວເສີມໃນແມ່ຍິງໄວໜັດປະຈຳເດືອນທີ່ມີມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນເຊິ່ງມີຕົວຮັບ ຮໍໂມນເປັນບວກ.
- ນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວມະເຮັງເຕົ້ານົມໄລຍະຮຸກຮາມໃນແມ່ຍິງໄວໜັດປະຈຳເດືອນທີ່ມີຄວາມຮຸ່ນແຮງ ຫຼາຍຂຶ້ນຫຼັງຈາກນຳໃຊ້ Tamoxifen ໃນການຮັກສາ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຫ້ຮັບປະທານວັນລະຄັ້ງ ຄັ້ງລະເມັດ (1mg).

ຂໍ້ທ້າມໃຊ້:

- ແມ່ຍິງກ່ອນໜັດປະຈຳເດືອນ ລວມທັງ ແມ່ຍິງກຳລັງຖືພາ ຫຼື ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາໝາກໄຂ່ຫລັງ ຫຼື ຕັບ ຊຸດໂຊມໝັກ.
- ຄົນເຈັບທີ່ແຜ່ຕໍ່ຢາ Anastrozole ຫຼື ແຜ່ສ່ວນປະກອບຂອງຢານີ້.

ຄຳເຕືອນ:

- ຄົນເຈັບທີ່ມີການກວດພົບທີ່ມີພະຍາດຫົວໃຈຂາດເລືອດ, ຄວນນຳໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງເນື່ອງຈາກມັກ ພົບເຫັນອາການທີ່ກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດເປັນສ່ວນຫຼາຍ.
- ຄົນເຈັບທີ່ນຳໃຊ້ມີກມີອາການອ່ອນເພຍ ແລະ ຊຶມເສົ້າ.
- ມີອາການຫຼຸດລົງຂອງແຮ່ທາດໃນກະດູກ, ຄວນພິຈາລະນາກວດກາແຮ່ທາດໃນກະດູກເປັນປະຈຳ.
- ຄວນອ່ານຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຢາຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາມການແນະນຳຂອງແພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ບັນດາຜົນຂ້າງຄຽງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພົບມີ: ການເກີດຜິວໜັງແດງ, ຊ່ອງຄອດແຫ້ງ, ເກີດການຂັບລັງ ນ້ຳມັນຂອງຕ່ອມໃຕ້ເສັ້ນຜົມຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຜົມມັນ, ມີການປິ່ນປ່ວນລະບົບລະລາຍ (ເບືອອາຫານ, ປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ຖອກທ້ອງ) ອິດເມືອຍ, ຊຶມເສົ້າ, ປວດຫົວ, ເປັນຜົນ ແລະ ອື່ນໆ ບັນດາ ຜົນຂ້າງຄຽງດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ຮຸນແຮງ ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດຮັບໄດ້.
- ການນຳໃຊ້ຢານີ້ພົບເຫັນ ການລາຍງານວ່າມີເລືອດອອກໃນມືດລູກເປັນບາງຄັ້ງ ຍ້ອນການປ່ຽນຮູບແບບ ການປິ່ນປົວ ຈາກການນຳໃຊ້ຮໍໂມນ ຖ້າພົບເຫັນອາການເລືອດໄຫຼທາງມືດລູກ ຄວນພິຈາລະນາໃນ ການຢຸດການໃຊ້.
- ໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ພົບເຫັນການລາຍງານການປ່ຽນແປງສະພາບການທ່າງານ ຂອງຕັບ (ເຊັ່ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງອັງຊີມ transpeptidase ແລະ alkaline phosphatase), ແຕ່ຄົນເຈັບ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບຕັບ ແລະ ກະດູກ ມາກ່ອນແລ້ວເຖິງບໍ່ທັນໃຫ້ຢາປິ່ນປົວກໍຕາມ. ການນຳໃຊ້ຢານີ້ ຍັງພົບເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງລະດັບໄຂມັນໃນເລືອດ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນໜັດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ນັບຈາກວັນຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ກັບມີ 10 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ, 1 ເມັດມີ 1 mg.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມ 20-25°C
- ເກັບຮັກສາຢາ ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com