

AVASTATIN

Generic name: Atorvastatin calcium

Brand Name: AVASTATIN

Composition: Atorvastatin Calcium.....20mg

Indications:

- hypercholesterolemia, primary hypercholesterolemia, coronary heart disease, complex dyslipidemia.

Dosage:

- The treatment of primary hypercholesterolemia and mixed hyperlipidemia: 10 mg, once daily.
- Heterozygous type treatment of familial hypercholesterolemia: initial dose of 10 mg/day per day. The dose can gradually adjusted to 40mg/ day at the interval of every 4 weeks. Maximum dose 80mg/ day.
- Treatment of homozygous familial hypercholesterolemia: The recommended dose of this product is 10-80mg/ day.

Contraindications:

- Active liver disease.
- Known allergy to any component of this product.
- Pregnancy.
- Lactating women.

Warning:

- Use with caution in children.
- Elderly people should use this medication with caution.

Adverse Effects:

- Gastrointestinal discomfort, headache, rash, dizziness, blurred vision and taste disturbance.
- Occasionally can cause reversible elevation of blood aminotransferase.
- Rare adverse reactions include impotence, insomnia, myositis, myalgia and rhabdomyolysis, acute renal failure, abnormal liver function, adrenal and gonadal effects, and central nervous system toxicity.
- Hepatitis, pancreatitis and allergic reactions such as angioneurotic edema have been reported.

Dosage form: White tablets.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Store at room temperature 20-25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ AVASTATIN

ຊື່ທົ່ວໄປ: Atorvastatin calcium

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: AVASTATIN

ສ່ວນປະກອບ: Atorvastatin Calcium.....20mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ໃຊ້ເປັນຢາ ລົດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ, ໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຈາກໄຂມັນສູງ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງແພດ ແລະ ຄໍາແນະນຳຂອງເພສັດຊະກອນເໝາະເໝາະ.
- ໃຊ້ຮັບປະທານ ຄັ້ງລະ 10 mg ຫຼື 20mg ຮັບປະທານວັນລະຄັ້ງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ໄຂມັນ ຫຼື ໂກເລັສເຕລອນໃນເສັ້ນເລືອດ.
- ສໍາລັບການປິ່ນປົວໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດຊະນິດ Heterozygous type ທີ່ຈຶ່ງໃຫ້ກຸ່ມ Hypercholesterolemia ຈາກກໍາມະພັນ: ໃຊ້ຮັບປະທານໂດຍເລີ່ມຈາກປະລິມານ 10mg/ວັນ, ຮັບປະທານວັນລະຄັ້ງ ແລະ ສາມາດຄ່ອຍປັບປະລິມານຂຶ້ນ ຮອດ 40mg/ ວັນ ພາຍໃນ ເວລາ 4 ອາທິດ ແຕ່ປະລິມານສູງສຸດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 80mg/ວັນ.
- ສໍາລັບການປິ່ນປົວໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ ທີ່ມີສາເຫດຈາກກໍາມະພັນ (Homozygous familial hypercholesterolemia): ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ໃນປະລິມານ 10-80mg/ວັນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ກັບຜູ້ແພ້ຢາມີ ຫຼື ແພ້ສ່ວນປະກອບຂອງຢາ.
- ຫ້າມໃຊ້ກັບຄົນທີ່ມີບັນຫາສະພາບຕັບຊຸດໂຊມ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.

ຄໍາເຕືອນ:

- ເປັນພິດຕໍ່ ລະບົບປະສາດສູນກາງ.
- ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໃນ ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໃນເດັກ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບຈາກການໃຊ້ຢາປະກອບມີ: ປວດຕາມຂໍ້, ຖອກຫ້ອງ, ມີອາການອັກເສບຕາມຄໍ ແລະ ດັງ, ອາດມີການຕິດເຊື້ອທາງເດີນປັດສະວະ, ປວດຂາ, ປວດຕາມກ້າມເນື້ອ ແຂນຂາ, ກ້າມເນື້ອຕິງ, ປຸ້ນຫ້ອງປວດຮາກ.
- ນອກນີ້ຍັງພົບບາງອາການຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄລຍະສັ້ນ ຈາກການປັບຮ່າງກາຍຕາມຜົນການໃຊ້ຢາ ເຊັ່ນ: ເກີດການປົ່ນປ່ວນກະເພາະ ລໍາໄສ້, ປວດຫົວ, ເປັນຜືນ, ວິນວຽນ, ສາຍຕາເຫັນພາບມືວບເຫັນແຈ້ງ, ການສຳຜັດລົດຊາດປ່ຽນໄປ, ປັດສະວະລຳບາກ ຮູ້ສຶກເຈັບ ເວລາປັດສະວະ, ປວດຫຼັງ, ຫ້ອງອິດ, ຫ້ອງຜູກ, ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຕົວ, ອາຫານບໍ່ຍອມ, ແສບຮ້ອນຊ່ວງເອີກ, ບໍ່ມີແຮງ ຄວາມຢາກອາຫານ ຫຼຸດລົງ, ສັ້ນ, ເຫືອອອກ, ຮາກ, ຖ້າພົບອາການເຫຼົ່ານີ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ລົບກວນການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິ ຄວນປຶກສາແພດ.
- ບາງກໍລະນີ ອາດພົບ ອາການເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ອັກເສບຫີຕິບ, ມ້າມ, ມີອາການແພ້, ອາການບວມຂອງປະສາດ Angioneurotic edema.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ

ວັນຫມົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດການບັນຈຸ: 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາ ໃນອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງ 20-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາ ໃຫ້ຫ່າງຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com