

BARINIX-4

Generic name: Baricitinib

Brand Name: BARINIX-4

Composition: Baricitinib.....4mg.

Indications:

Rheumatoid arthritis, 2019 coronavirus (COVID-19), Alopecia areata.

Dosage:

- Orally, with or without food.
- Rheumatoid arthritis: once daily, 2mg each time.
- 2019 Coronavirus (COVID-19): once daily, 4mg each time, continuous medication for 14 days.
- Alopecia areata: once daily, 2mg each time. If the treatment effect is not significant, then once daily, 4mg each time. After achieving the therapeutic effect, it was changed to 2mg once a day.

Contraindications: None.

Warning:

- Pregnant women should use with caution.
- If allergic reactions occur during medication, stop using it in a timely manner.
- Tuberculosis patients should use it with caution.
- Pay attention to infection and monitor changes in lymphocytes, neutrophils, hemoglobin, liver enzymes, and lipids.
- Vaccination: Avoid using with live vaccines.
- Gastrointestinal perforation.

Adverse reaction:

Upper respiratory tract infections, nausea, herpes simplex and shingles; Elevated liver enzymes, increased platelets, deep vein thrombosis, pulmonary embolism; Headache, acne, hyperlipidemia, increased creatine kinase, and urinary tract infections.

Dosage form: White tablets

Expiry date: 24 months from the date of manufacture.

Packaging: 30 tablets/bottle.

Storage:

- Protected from light, sealed, and stored at 20°C- 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ BARINIX-4

ຊື່ທົວໄປ: Baricitinib

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: BARINIX-4

ສ່ວນປະກອບ: Baricitinib.....4mg.

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

ໃຊ້ປິ່ນປົວ ພະຍາດປະດິງຂໍ້ອັກເສບ, ໃຊ້ປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວອາການທີ່ເກີດຈາກ COVID-19, ໃຊ້ປິ່ນປົວ ບັນເທົາອາການຜິມລືນເປັນຈຸດ (Alopecia areata).

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ຮັບປະທານ, ກ່ອນຫລືຫລັງອາຫານ.
- ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດປະດິງຂໍ້ອັກເສບ: ໃຊ້ຮັບປະທານວັນລະຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 2 mg;
- ໃຊ້ປິ່ນປົວອາການ ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ໃຊ້ກິນວັນລະຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 4 mg, ກິນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 14 ວັນ;
- ປິ່ນປົວອາການຜິມລືນ (Alopecia areata): ກິນວັນລະຄັ້ງໃນປະລິມານ 2 mg. ຖ້າຜົນການປິ່ນປົວບໍ່ເຫັນການປ່ຽນແປງ ໃຫ້ປັບປະລິມານຂຶ້ນເປັນ 4 mg ຈົນເຫັນຜົນການປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນ ຈຶ່ງປັບປະລິມານລົງມາ ເປັນ 2 mg ຕໍ່ວັນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້: ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄຳເຕືອນ:

- ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ຄວນໃຫ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການນຳໃຊ້.
- ຖ້າພົບເຫັນອາການແຜ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ ຄວນຢຸດຕິການນຳໃຊ້ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະປິ່ນປົວຕາມອາການ.
- ໃນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກ ໃຫ້ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
- ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຢາ ຄວນມີການກວດຕິດຕາມ ການປ່ຽນແປງ ເມັດເລືອດຂາວ Lymphocytes, Neutrophils, ກວດເມັດເລືອດແດງ, ກວດຫນ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບ ແລະລະດັບໄຂມັນ ເປັນຕົ້ນ.
- ກໍລະນີຢູ່ໃນຊ່ວງສັກວັກຊີນ: ບໍ່ຄວນໃຊ້ຮ່ວມກັບວັກຊີນຊະນິດເຊື້ອເປັນ (Live vaccines).
- ມີບັນຫາໃນລະບົບ ກະເພາະລຳໄສ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ສາມາດເກີດການຕິດເຊື້ອ ລະບົບຫາຍໃຈສ່ວນເທິງ, ປຸ້ນທ້ອງ, ຜິວຫນັງເປັນຜືນແດງ(Herpes), ປ່ຽນແປງຫນ້າທີ່ການທຳງານຂອງແອນໄຊໃນຕັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະລິມານເມັດເລືອດນ້ອຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ເກີດລົມເລືອດ ພາໃຫ້ມີການອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ ໃນຈຸດເລິກ, ເສັ້ນເລືອດຫລໍ່ລ້ຽງປອດຖືກອຸດຕັນ, ປວດຫົວ, ເປັນສິວ, ໄຂມັນສູງໃນເລືອດ, ປະລິມານ Creatine kinase ສູງໃນເລືອດ, ແລະເກີດການຕິດເຊື້ອໃນພິກຍ່ຽວ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນເມັດສີຂາວ

ວັນທີຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນນັບຈາກວັນທີຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາຢາ ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບຮັກສາຢາໃນຫ້ອງ ທີ່ມີອຸນຫະພູມ 20°C- 25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາ ໃຫ້ຫ່າງຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com