

ເອກະສານກຳກັບຢາ CAPANIB

ຊື່ທົວໄປ: Capmatinib

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: CAPANIB

ສ່ວນປະກອບ: Capmatinib.....200mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- ໃຊ້ປິ່ນປົວມະເຮັງ ຊະນິດ non-small cell lung cancer (NSCLC) ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະ ທີ່ພົບ MET exon 14 skipping ເຊິ່ງເຊື່ອມະເຮັງຢູ່ໃນໄລຍະແຜ່ກະຈາຍ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ກິນຄັ້ງລະ 2 ເມັດ (400mg) ກິນ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ ໄລຍະເວລາຫ່າງກັນ 12 ຊມ, ກໍລະນີຄົນເຈັບ ຮາກອອກບໍ່ຄວນໃຫ້ກິນຄືນໃຫມ່ ໃຫ້ສືບຕໍ່ກິນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດຖັດໄປ.
- ນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າການປິ່ນປົວຈະໄດ້ຮັບຜົນດີຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່ມີຜົນໃດໆເກີດໃນລະຫວ່າງການ ປິ່ນປົວ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້: ພົດເຍືອຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນລາຍງານຈາກການນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຢານີມີຜົນເປັນພິດຕໍ່ເດັກໃນຄັ້ນ ຈຶ່ງຫ້າມໃຊ້ໃນຍິງຖືພາ, ຄວນມີການກວດບົງມະຕິຍືນຍັນ ກ່ອນການນຳໃຊ້ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໃນການໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດ ອາດພາໃຫ້ຜົນອອກລືດຂອງຢາເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້ ຄວນຢຸດກິນຢາຄຸມຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງອາທິດກ່ອນການນຳໃຊ້.
- ຫ້າມໃຊ້ຢານີ ໃນໄລຍະທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.
- ກໍລະນີ ບໍ່ມີຜົນໃນການປິ່ນປົວ ເຮັດໃຫ້ອາການຄົນເຈັບຫນັກຂຶ້ນເຊັ່ນ: ປອດອັກເສບ ຄວນຢຸດ ການໃຊ້ຢາຊື້ວຄາວ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນແຜບໍລິເວນເຍືອຫຸ້ມປອດ, ປອດບວມອັກເສບ ແລະ ເກີດອາການ ບວມ ຕາມບໍລິເວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ຫນ້າ, ແຂນ, ຂາ.
- ເຈັບແໜ້ນໜ້າເອິກ, ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ, ບໍ່ຢາກເຂົ້າ, ນ້ຳຫນັກຫຼຸດ, ເປັນພິດຕໍ່ຕັບ, ຄັນຕາມ ຕົນໂຕ, ປຸ້ນທ້ອງ ປວດຮາກ, ຮາກ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີນ້ຳຕານ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃສ່ກ່ອງ, 1 ກ່ອງ ມີ 56 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບໄວ້ບ່ອນບໍ່ມີແສງແດດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 30°C.
- ເກັບໄວ້ຫ່າງໄກຈາກເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

CAPANIB

Generic name: Capmatinib

Brand name: CAPANIB

Composition: Capmatinib.....200mg

Indications:

- Used for the treatment of adult patients with metastatic, non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumors have tested positive for a mutation that leads to MET exon 14 skipping.

Dosage:

- Take 2 tablets (400mg) twice daily, every 12 hours at scheduled times. If a patient misses or vomits a dose, do not make up dose but take the next dose at its scheduled time.
- Continue until disease progression or unacceptable toxicity.

Contraindication: No report

Warnings:

- Do not take if pregnant, perform pregnancy test prior to initiating dosage, use contraception while medicating and for 1 week after last dose.
- Do not take while breastfeeding.
- If patient develops interstitial lung disease/pneumonitis of any degree immediately and permanently discontinue.

Adverse effects:

- Bloating or swelling of the face, arms, hands, lower legs or feet.
- Chest pain, decrease or loss of appetite, difficult or labored breathing, general feeling of discomfort or illness, itching, nausea and vomiting.

Dosage form: Brown tablet.

Expiry date: 24months after date of manufacture.

Packaging: 56 tablets per bottle.

Storage:

- Store in a cool and dry place below 30°C protect from light.
- Keep out of the reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com