

ເອກະສານກຳກັບຢາ Cavir-0.5

ຊື່ທົດໄປ: Entecavir

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: Cavir-0.5

ສ່ວນປະກອບ: Entecavir.....0.5mg

ຂ້ອງໃຊ້:

- ໃຊ້ປິ່ນປົວເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ B ຊຳເຮືອ (HBV) ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ມີທັງເຊື້ອ HIV ແລະ HBV.

ວິທີໃຊ້:

- ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ກິນ 1mg ຕໍ່ມື້.
- ຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຕັບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດ nucleoside naive ແມ່ນໃຫ້ກິນ 0.5mg ຕໍ່ມື້.
- ການໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ທົນທານຕໍ່ lamivudine ແມ່ນໃຫ້ກິນ 1mg ຕໍ່ມື້.
- ເດັກທີ່ເປັນພະຍາດຕັບ ຫຼື ພະຍາດ nucleoside naive ≥ 2 ປີ ≥ 10 kg ກິນ 0.015mg/kg ມື້ລະຄັ້ງ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 0.5mg ຕໍ່ມື້. ໃນຄົນເຈັບທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັບ lamivudine ກິນ 0.03mg/kg ມື້ລະຄັ້ງ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 1mg ຕໍ່ມື້.
- ກິນໃນເວລາທີ່ອາໄສຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຊົ່ວໂມງກ່ອນອາຫານຄາບຕໍ່ໄປ.

ຂັ້ນຕອນໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ແພ້ຢາມີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບຄື: ພາວະເມັດເລືອດນ້ອຍຕ່ຳ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ປວດຫົວ, ອ່ອນເພຍ, ວິນວຽນ, ປຸ້ນທ້ອງ, ເປັນຜືນ, ນອນບໍ່ລັບ ແລະ ຜົມລົ້ນ.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນທີອາຍຸ: 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງ 28 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບໄວ້ບ່ອນບໍ່ມີແສງແດດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ 20-25°C.
- ເກັບໄວ້ຫ່າງໄກຈາກເຕັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

Cavir-0.5

Generic name: Entecavir

Brand name: Cavir-0.5

Composition: Entecavir.....0.5mg

Indications:

- Used for the treatment of chronic hepatitis B virus (HBV)
- In patients with both HIV and HBV an antiretroviral medication should also be used.

Dosage:

- Adult: 1mg daily
- Patients with hepatic impairment or nucleoside naïve patient; 0.5mg once daily.
- Patients with resistance or concomitant use with lamivudine; 1mg once daily.
- Child: with hepatic impairment or nucleoside naïve patient; ≥ 2 years ≥ 10 kg; 0.015mg/kg once daily. Max: 0.5mg daily. In patients with concomitant use with lamivudine: 0.03mg/kg once daily Max 1mg daily.
- Take orally on an empty stomach at least 2 hours after last meal and at least 2 hours before next meal.

Contraindications:

- Hypersensitivity to this drug.

Warnings:

- Do not take while pregnant or breastfeeding.

Adverse effects:

- Thrombocytopenia, nausea, vomiting, diarrhea, dyspepsia, abdominal pain, fatigue, pyrexia, headache, dizziness, insomnia, rash, alopecia.

Dosage form: White tablet

Expiry date: 36 months after date of manufacture.

Packaging: 28 tablets/bottle.

Storage:

- Store between 20-25°C protect from light, use gloves while handling.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com