

ELAPRIL-20

Generic name: Enalapril Maleate tablets

Brand name: ELAPRIL-20

Composition : Enalapril Maleate..... 20mg.

Indications:

Primary hypertension, Renovascular hypertension, heart failure at all levels, prevention of symptomatic heart failure, prevention of coronary ischemic events in patients with left ventricular dysfunction.

Dosage:

- Primary hypertension: The initial dose is 10-20mg, once a day; The commonly used maintenance dose is 20mg, and the maximum daily dose should generally not exceed 40mg.
- Renovascular hypertension, combined with Diuretic for treatment of hypertension: the initial dose is 5mg, once a day, and according to the patient's condition, the dose can be gradually maintained at 20mg, Once a day.
- Heart failure, Asymptomatic left ventricular dysfunction, renal dysfunction: the initial dose is 2.5mg, once a day, and the dose can be gradually maintained at 20mg according to the patient's condition, Once a day.

Contraindications:

- It should not be used by people allergic to this product or patients with bilateral Renal artery stenosis.
- It is forbidden to use ACE inhibitor to treat patients with Angioedema history, hereditary or idiopathic Angioedema.
- It is forbidden to use it in combination with aligilen and Enkephalinase inhibitors.

Warning:

- Regularly perform white blood cell counts and renal function measurements.
- Prohibited for pregnant women. Children, lactating women, and those with severe renal function impairment should use it with caution.

Adverse Effects:

There may be dizziness, headache, lethargy, dry mouth, fatigue, upper abdominal discomfort, nausea, palpitations, chest tightness, cough, flushed face, rash and proteinuria. Reduce if necessary. If leukopenia occurs, the drug should be discontinued.

Dosage form: Orange tablets

Expiry date: 24 months from the date of manufacture

Packaging: 12 Tablets/blister, 50 blisters/box

Storage:

- Shading and sealed storage (below 25°C)
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.
Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: +856-21-737 051.
www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ELAPRIL-20

ຊື່ທົ່ວໄປ: Enalapril Maleate tablets

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ELAPRIL-20

ສ່ວນປະກອບ: Enalapril Maleate..... 20mg.

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

ໃຊ້ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ ໂດຍການໃຊ້ດ່ຽວ ຫລືໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາລົດຄວາມດັນຊະນິດອື່ນ ໂດຍສະເພາະຢາຂັບປັດສະວະ, ໃຊ້ໃນຄົນເຈັບ ທີ່ເປັນ Congestive heart failure (CHF) ໃຊ້ ປ້ອງກັນອາການ ຈາກພະຍາດຫົວໃຈລົມເຫລວ ປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດຈາກ ຫລອດເລືອດຫົວໃຈ ຂາດເລືອດ ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີການທ່າງານຜິດປົກກະຕິ ຂອງຫ້ອງຫົວໃຈດ້ານລຸ່ມຊ້າຍ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນຕື່ມ: ໃນປະລິມານເລີ່ມຕົ້ນ ໃຫ້ 10-20mg, ໃຊ້ກິນວັນ ລະຄັ້ງ, ໂດຍຫົວໄປແລ້ວ ປະລິມານທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມດັນເປັນປະຈຳແມ່ນ 20mg ຕໍ່ວັນ, ສູງສຸດ ແມ່ນບໍ່ຄວນໃຫ້ເກີນ 40mg.
- ໃຊ້ຄວບຄຸມຄວາມດັນ ໂດຍໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຂັບປັດສະວະ, ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ໃຊ້ ໃນປະລິມານຄັ້ງ ລະ 5mg ວັນລະຄັ້ງ, ແລະຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງຄົນເຈັບ ແລະສາມາດຄ່ອຍປັບ ປະລິມານຂຶ້ນ ໃນລະດັບ ຄັ້ງລະ 20mg ວັນລະຄັ້ງ.
- ໃຊ້ໃນພາວະຫົວໃຈລົມເຫລວ ຈາກອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຫ້ອງຫົວໃຈລຸ່ມຊ້າຍ, ໄຂ່ຫລັງ ທ່າງານຜິດປົກກະຕິ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍປະລິມານ 2.5mg ວັນລະຄັ້ງ ແລະຄ່ອຍປັບປະລິມານ ຂຶ້ນ ຢູ່ໃນລະດັບ 20mg ຕາມສະພາບອາການຕົວຈິງຂອງຄົນເຈັບ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ແຜ່ຢານີ, ແລະຄົນເຈັບທີ່ມີເສັ້ນເລືອດຫລັ່ງໄຂ່ຫລັງຕິບທັງສອງດ້ານ (Bilateral Renal Artery Stenosis).
- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບ ທີ່ໃຊ້ຢາກຸ່ມ ACE inhibitor ໃນການປິ່ນປົວ Angioedema, Hereditary ຫລື Idiopathic Angioedema.
- ຫ້າມໃຊ້ຢານີ ກັບຄົນເຈັບທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢາກຸ່ມ Aligilen ແລະ Enkephalinase inhibitors.

ຄຳເຕືອນ:

- ໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ຢາ ຄວນມີການກວດເລືອດ ເພື່ອກວດນັບເມັດເລືອດຂາວ ແລະກວດ ການທ່າງານຂອງໄຂ່ຫລັງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
- ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ, ໃນເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີ ບັນຫາກ່ຽວກັບການທ່າງານຂອງໄຂ່ຫລັງຜິດປົກກະຕິ ຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ສາມາດພາໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳ ໂດຍສະເພາະເວລາໃຊ້ຢາໃນປະລິມານສູງ ຫລືໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາ ຂັບປັດສະວະ, ລົບກວນການທ່າງານຂອງໄຂ່ຫລັງ ໃນຄົນເຈັບທີ່ໃຊ້ຢາໃນປະລິມານສູງອາດເກີດ ບັນຫາໄຂ່ຫລັງຢຸດທ່າງານ ໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂ່ຫລັງຜິດປົກກະຕິ, ອາດ ພົບເຫັນປະລິມານນ້ຳຕານສູງຜິດປົກກະຕິໃນເລືອດ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງພົບ ອາການວິນວຽນຫົວ, ປວດຫົວ, ປາກແຫ້ງ, ໄອ, ອ່ອນເພຍ ບໍ່ສະບາຍ ປຸ້ນທ້ອງ ໃຈສັ່ນ, ແຫນ້ນຫນ້າເອິກ, ຫນ້າແດງ, ເປັນຜືນ, ພິບປູ້ຕີນ ໃນປັດສະວະ ຫາກເກີດພາວະເມັດເລືອດຂາວເພີ່ມຂຶ້ນໃນເລືອດ ຄວນຢຸດນຳ ໃຊ້ຢາ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນຢາເມັດສີສົມ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 12 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາຢາໃນກັບກ່ອງເດີມ ປິດໃຫ້ສະຫນິດ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງ ເກັບຮັກສາຢາໃນຫ້ອງ ທີ່ມີ ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 25°C.

- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com