

ESOMIRAZO

Generic name: Esomeprazole magnesium enteric capsules

Brand Name: ESOMIRAZO

Composition: Esomeprazole.....40mg

Indications:

- Gastroesophageal reflux disease (GERD): Treatment of reflux esophagitis.
- Combine medication to eradicate *Helicobacter pylori*.
- Patients with gastric ulcers who require continuous NSAID treatment.

Dosage:

- Take this product at least one hour before meals
- Treatment of reflux esophagitis: 20mg or 40mg, once daily, for 4-8 weeks;
- Combination medication for eradicating *Helicobacter pylori*: Esomeprazole magnesium 20mg+Amoxicillin 1g+Clarithromycin 500mg, twice daily, for a total of 7 days.
- Use NSAID to treat related gastric ulcers: once a day, 20mg, for 4-8 weeks.

Contraindications:

- Individuals who are allergic to this product.
- Esomeprazole should not be used in combination with nefenavir.

Warning:

- Acute interstitial nephritis, lupus erythematosus and hypomagnesemia may occur.
- It should be avoided to use in combination with clopidogrel, hypericum perforatum, rifampicin, or methotrexate

Adverse Effects:

Headache, diarrhea, nausea, bloating, abdominal pain, constipation, dry mouth, shortness of breath, and elevated ALT.

Dosage form: Red white Capsule

Expiry date: 36 months from the date of manufacture

Packaging: 10 capsules/blister, 50 blisters/box.

Storage:

- Sealed and stored at no more than 25 °C.
- Please keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ESOMIRAZO

ຊື່ທົ່ວໄປ: Esomeprazole magnesium enteric capsules

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ESOMIRAZO

ສ່ວນປະກອບ: Esomeprazole.....40mg

ຂໍ້ຍິງໃຊ້:

- ໃຊ້ເປັນຢາລົດການຫຼັງຂອງກົດໃນກະເພາະອາຫານ, ປົນປົວອາການກົດໄຫຼຍ້ອນ ແສບຮ້ອນກາງເອິກ ມີແຜໃນທາງເດີນອາຫານ.
- ຍັງໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາອື່ນເພື່ອທຳລາຍເຊື້ອ *Helicobacter pylori* ທີ່ຢູ່ຕາມກະເພາະລຳໄສ້.
- ໃຊ້ປົນປົວບາດແຜກະເພາະອາຫານ ທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ຢາ NSAID.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ຮັບປະທານ ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ ຫຼື ເພສິດຊະກອນ ໃຊ້ຮັບປະທານ ກ່ອນອາຫານ 1 ຊົ່ວໂມງ;
- ເພື່ອປົນປົວອາການກົດໄຫຼຍ້ອນ: ໃຊ້ຮັບປະທານໃນປະລິມານ 20mg ຫຼື 40mg, ວັນລະຄັ້ງ, ເປັນເວລາ 4-8 ອາທິດ;
- ໃຊ້ເພື່ອປົນປົວກຳຈັດເຊື້ອ *Helicobacter pylori*: ໃຊ້ Esomeprazole magnesium 20mg+Amoxicillin 1g+Clarithromycin 500mg, ໃຊ້ຮັບປະທານ 2 ເທື່ອ/ວັນ, ເປັນເວລາ 7 ວັນ.
- ໃຊ້ປົນປົວບາດແຜກະເພາະ ຈາກການໃຊ້ຢາແກ້ປວດລົດໄຂ້ກຸ່ມ NSAID: ໃຊ້ຮັບປະທານ ຄັ້ງລະ 20mg ວັນລະຄັ້ງ ເປັນເວລາ 4-8 ອາທິດ.

ຂ້າຢາມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ແຜ່ຢາມີ.
- ຫ້າມໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຕ້ານໄວຣັສ ກຸ່ມ nefenavir.

ຄຳເຕືອນ:

- ການໃຊ້ຢາມີ ອາດພາໃຫ້ເກີດໝາກໄຂ້ຫຼັງອັກເສບຮຸນແຮງ (Acute interstitial nephritis), ອາດພາໃຫ້ເກີດ Lupus erythematosus ແລະ ພົບມາເຍຊຽມໃນເລືອດຕ່ຳໄດ້ (Hypomagnesemia).
- ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາມີ ຮ່ວມກັບບັນດາຢາດັງຕໍ່ໄປນີ້ ເພາະຈະເກີດປະຕິກິລິຍາປໍລະປັກຂອງຢາ ເຊັ່ນ: ຢາກຸ່ມ Clopidogrel, Hypericum perforatum, Rifampicin, or Methotrexate ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ບັນດາຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບມີ ເຈັບຫົວ, ຖອກທ້ອງ, ປຸ້ນທ້ອງ, ທ້ອງອິດ ເຈັບຊ່ວງທ້ອງ, ທ້ອງຜູກ, ປາກແຫ້ງ, ຫາຍໃຈຖີ, ກວດພົບ ALT ສູງໃນເລືອດ.

ຮູບແບບຢາ: ແຄັບຊຸນສີຂາວແດງ.

ວັນຫມົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸມັດທຳ: 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ແຄັບຊຸນ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນພາຊະນະເຕີມ, ຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງ ບໍ່ເກີນ 25 °C.
- ເກັບຮັກສາຢາຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຝາກມາ ກຮຸບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com