

ເອກະສານກຳກັບຢາ I-MECT 12

ຊື່ທົວໄປ: Ivermectin

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: I-MECT 12

ສ່ວນປະກອບ: Ivermectin.....12mg.

ຂ້າງໃຊ້:

- ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດແມງລືດຕ່າງ (onchocerciasis), ພະຍາດເສັ້ນຕ້າຍ, ແມ່ທ້ອງປາກຂໍ, ແມ່ທ້ອງກິມ, ແມ່ທ້ອງແສ້ມ້າ ແລະ ແມ່ທ້ອງເຂັມມຸດ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ຕາມຄໍາສັ່ງແພດໝໍ.
- ກິນໃນປະລິມານ 1mg ຕໍ່ 5kg, ຕ້ອງກິນໃນເວລາທ້ອງຖ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຊົ່ວໂມງຫຼັງອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຊົ່ວໂມງກ່ອນອາຫານຄາບຕໍ່ໄປ, ຕື່ມນ້ຳພ້ອມຢ່າງໜ້ອຍ 250ml.

ຂັ້ນຕອນໃຊ້:

- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢານີ້.

ຄໍາເຕືອນ:

- ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ການໃຊ້ຢານີ້ ອາດພາໃຫ້ມີຜົນຂ້າງຄຽງເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຖອກທ້ອງ, ຮາກ, ເມືອຍ, ປວດຕາ ມີບັນຫາກັບການເບິ່ງເຫັນ, ຄັນຕາມຜິວໜັງ, ຈິດໃຈສັບສົນ, ອາການບວມຕາມຕີນ ແລະ ມື.

ຮູບແບບຢາ: ຢາເມັດສີຂຽວ.

ວັນທີອາຍຸ: 24 ເດືອນ ນັບຈາກວັນທີຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 2 ແຜງ, 1 ແຜງ ມີ 12 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີ ອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາ ຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

I-MECT 12

Generic name: Ivermectin

Brand name : I-MECT 12

Composition: Ivermectin.....12mg.

Indications:

- Ivermectin is an anti-parasitic medication used orally to treat strongyloidiasis, onchocerciasis, ascariasis, trichuriasis and enterobiasis.

Dosage:

- Orally administered.
- 1mg per 5kg of body weight, must be taken on an empty stomach at least 2 hours after the last meal and at least 1 hour before next meal. Swallow with at least 250ml of water.

Contraindications:

- Pregnant and lactating women should not use this drug.

Warnings:

- Do not take this medication while pregnant.

Adverse effects:

- Possible adverse reactions include: diarrhea, vomiting, nausea, eye pain and problems with vision, skin rash, mental confusion, swollen glands and swelling of the hands and feet.

Dosage form: Green tablet.

Expiry date: 24 months after date of manufacture.

Packaging: 12 tablets per blister pack, 2 blister packs per box.

Storage:

- Store in original packaging 20°C-25°C, protected from moisture and direct sunlight.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com