

LORATTADIN

Generic name: Loratadine Tablets

Proprietary Name: LORATTADIN

Composition:

Loratadine.....10mg

Indications:

It is used to relieve symptoms related to Allergic rhinitis, such as sneezing, runny nose, itchy nose, stuffy nose, itchy eyes and burning sensation. After taking oral medication, nasal and eye symptoms and signs can be quickly relieved. It is also suitable for relieving the symptoms and signs of chronic Hives, itchy skin diseases and other allergic skin diseases.

Dosage:

Adults and children aged 12 and above: 1 tablet (10mg) once a day.

Children aged 2-12:

Body weight >30kg: 1 tablet (10mg) once a day.

Body weight ≤ 30kg: once a day, half a tablet (5mg).

Contraindications:

Prohibited for those who are allergic to this product.

Warning:

1. Patients with severe liver dysfunction should use it under the guidance of a doctor.
2. Pregnant and lactating women should use it with caution.
3. The use of this product should be discontinued approximately 48 hours before the skin test, as antihistamines can prevent or reduce the occurrence of positive skin test reactions.
4. Taking Ketoconazole, Macrolide antibiotics, Cimetidine, theophylline and other drugs at the same time will increase the concentration of Loratadine in plasma, so it should be used with caution and consult a doctor.

Adverse Effects:

Fatigue, headache, drowsiness, dry mouth, gastrointestinal discomfort including nausea, gastritis, and rash.

Dosage form: White tablet

Expiry date : 36 months from the date of manufacture

Packaging: 10 tablets/blister, 50 blisters/box

Storage:

- Shading and sealed storage.
- Please keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: (856-21) 737 051.

www.alliancechems.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ LORATTADIN

ຊື່ທົ່ວໄປ: Loratadine Tablets

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: LORATTADIN

ສ່ວນປະກອບ: Loratadine.....10mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

ໃຊ້ເປັນຢາ ບັນເທົາອາການຕ່າງໆທີ່ມີສາເຫດມາຈາກ ການແພ້ ດັງ, ໂຜ່ງດັງ ອັກເສບຈາກການແພ້ ສະແດງອອກຄື: ຈາມ, ນ້ຳມຸກໄຫລ, ຄັນດັງ, ຕັນດັງ, ຄັນເຫຍືອເມືອກຕາ ແລະແສບອອກຮ້ອນ ຕົວ ຢາຈະອອກລົດ ໃນການຕ້ານ ອິດສະຕາມິນ ເຮັດໃຫ້ບັນດາ ອາການເຫລົ່ານັ້ນຜ່ອນຄາຍ ຫລືຫາຍໄປ, ນອກຈາກນີ້ ຕົວຢາ ຍັງ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການ ຄັນຄາຍ ເປັນຜົນຕາມຜົວຫນຶ່ງຈາກ ການແພ້ຕ່າງໆທາງ ຜິວຫນັງ.

ວິທີໃຊ້:

ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເດັກ ອາຍຸເກີນ 12 ປີ ໃຫ້ຮັບປະທານ ວັນລະຄັ້ງ, ຄັ້ງລະເມັດ (10mg).

ສຳລັບເດັກ ລະຫວ່າງ 2-12 ປີ:

ທີ່ມີ ນ້ຳໜັກ ຫລາຍກວ່າ 30kg: ໃຫ້ຮັບປະທານ ວັນລະຄັ້ງ ຄັ້ງລະເມັດ (10mg).

ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີນ້ຳໜັກ ເທົ່າກັບ 30kg ຫລືຕ່ຳກວ່າ ໃຫ້ແບ່ງຮັບປະທານ ຄັ້ງລະເຄິ່ງເມັດ ຮັບປະທານວັນ ລະຄັ້ງ (5mg).

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແພ້ຢານີ້.

ຄຳເຕືອນ:

- ຄົນເຈັບ ທີ່ມີບັນຫາ ຫນ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບຜິດປົກກະຕິ ຄວນປຶກສາແພດກ່ອນການນຳໃຊ້.
- ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາ ແລະກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່. ຄວນໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
- ກັບຜູ້ໃຊ້ຢານີ້ ກ່ອນການນຳໃຊ້ຄວນທຳການກວດຜິວຫນັງ ຫລື ກວດປະຕິກິລິຍາ ທີ່ສຳພັນກັບ Antihistamines ຄວນມີໄລຍະຫ່າງ 48 ຊມ ກ່ອນດຳເນີນການກວດ, ເພາະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນ ການກວດຜິດພາດໄດ້.
- ການໃຊ້ຢານີ້ ຮ່ວມກັບ ຢາປະເພດອື່ນເຊັ່ນ Ketoconazole, Macrolide antibiotics, Cimetidine, Theophylline ຫລື ບາງຕົວຢາຊະນິດອື່ນ ສາມາດເກີດປະຕິກິລິຍາ ເຊິ່ງກັນແລະກັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນປຶກສາແພດ ກ່ອນການນຳໃຊ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

ອາການຂ້າງຄຽງ ທີ່ມັກພົບ ປະກອບມີ: ອ່ອນເພຍ, ປວດຫົວ, ງ່ວງຊຶມ, ປາກແຫ້ງ, ປັນປ່ວນລະບົບລະບາຍ, ປຸ້ນຫ້ອງ, ເປັນພະຍາດກະເພາະ ແລະ ເປັນຜົນຕາມຜົວຫນຶ່ງ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນຫມົດອາຍຸ : 36 ເດືອນຫລັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການບັນຈຸມັດຫໍ່: 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບໄວ້ ໃນກັບກ່ອງ ບັນຈຸເດີມ, ໃນຮົ່ມ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ.
- ເກັບຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມື້ເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: (856-21) 737 051

www.alliancechems.com