

ເອກະສານກຳກັບຢາ METFORMIN-500

ຊື່ທົ່ວໄປ: Metformin hydrochloride

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: METFORMIN-500

ສ່ວນປະກອບ: Metformin hydrochloride.....500mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ ຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຈັດໃນກຸ່ມ First line ເປັນຢາປິ່ນປົວເບົາຫວານ ປະເພດສອງ ທີ່ມີພາວະຕ້ານຕໍ່ອິນຊູລິນຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຫ້ກິນຄັ້ງລະ 1 ເມັດ (500mg) ກິນ 2 ຫຼື 3 ຄັ້ງ/ມື້ ກິນຮ່ວມອາຫານ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ບໍ່ຄວນໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີພະຍາດຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງທ່າງານຜິດປົກກະຕິ, ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈທີ່ກຳລັງປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແພ້ຢາ Metformin.

ຄຳເຕືອນ:

- ໃນໄລຍະໃຊ້ຢາ ບໍ່ຄວນດື່ມ ເຫລືອ, ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີເອລກໍ່.
- ຄວນຢຸດການປິ່ນປົວກ່ອນການຜ່າຕັດ.
- ໃຊ້ຢາງ່າລະມັດລະວັງໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈລົມເຫຼວ, ຄົນທີ່ມີໄຂ້, ບາດແຜ, ຜ່າຕັດ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງບົກຜ່ອງ ຫຼື ຕັບອັກເສບ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງອາດຈະປະກອບມີ:
 - ບັນຫາກ່ຽວກັບກະເພາະອາຫານ: ຖອກທ້ອງ, ປຸ້ນທ້ອງ-ຮາກ, ປວດທ້ອງ, ປວດຫົວໃຈ, ມີແກັສໃນກະເພາະ.
- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸນແຮງອາດຈະປະກອບມີ:
 - ອາດພາໃຫ້ກົດ Lactic ເພີ່ມຂຶ້ນໃນກະແສເລືອດ, ເຮັດໃຫ້ເລືອດມີພູມເປັນກົດ ຈະມີອາການ: ປວດເມືອຍ, ອ່ອນເພຍ, ປວດກ້າມຊີ້ນ, ຫາຍໃຈຝືດ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ປວດທ້ອງ, ວິນຫົວ-ປວດຮາກ ແບບເບົາບາງ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້ຳຜິດປົກກະຕິ.
 - ນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳຈະມີອາການ: ປວດຫົວ, ອ່ອນເພຍ, ສັບສິນ-ກະວົນກະວາຍ, ຕົວສັ່ນ, ຮູ້ສຶກເຫງົາງອນ, ວິນຫົວ, ຫງຸດງືດ, ເຫືອອອກ, ຫົວ ແລະ ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈໄວ.
 - ຄົນເຈັບທີ່ຂາດວິຕາມິນ B12 ຈະມີອາການ: ຂາດພະລັງງານ, ກ້າມເນື້ອອ່ອນເພຍ, ເບືອອາຫານ ແລະ ເຈັບປວດມື-ຕີນ.

ຮູບແບບ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນໝົດອາຍຸ: 36 ເດືອນຫຼັງຈາກວັນຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກີບ, 1 ກີບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບໄວ້ບ່ອນບໍ່ມີແສງແດດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ 25°C.
- ເກັບໄວ້ຫ່າງໄກຈາກເດັກນ້ອຍ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຮູບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

METFORMIN-500

Generic name: Metformin hydrochloride

Brand name: METFORMIN-500

Composition: Metformin hydrochloride500mg

Indications:

- The first line medication used to treat type-2 diabetes particularly in overweight people.

Dosage:

- 500mg 2 or 3 times daily taken with food.

Contraindications:

- Renal dysfunction.
- Congestive cardiac failure needs drug treatment.
- Hypersensitivity to metformin.
- Acute or chronic metabolic acidosis.
- Impaired hepatic function.

Warnings:

- Use with caution in patients with congestive heart failure, fever, trauma, surgery, the elderly, renal impairment, or hepatic impairment.
- Instruct patients to avoid alcohol.
- Suspend treatment prior to any type of surgery.

Adverse effects:

- Mild side effects may include:
 - Stomach problems, diarrhea, nausea, stomach pain, heartburn, gas.
- Serious side effects may include:
 - acidosis. Symptoms can include: tiredness, weakness, unusual muscle pain, trouble breathing, unusual sleepiness, stomach pain, nausea, vomiting, dizziness, or lightheadedness, slow or irregular heartbeat.
 - Hypoglycemia. Symptoms may include: headache, weakness, confusion, shaking or feeling jittery, drowsiness, dizziness, irritability, sweating, hunger, fast heart rate.
 - Low vitamin B12 levels. Symptoms may include: low energy, muscle weakness, loss of appetite, tingling or numbness in the hands and feet.

Dosage form: White tablet

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Packaging: 10 tablets per blister pack, 50 blister packs per box.

Storage:

- Store in original packaging in a dark, dry place, under 25°C.
- Keep away from children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com