

## OMIRAZO

**Generic name:** Omeprazole

**Brand Name:** OMIRAZO

**Composition:** Omeprazole.....20mg

**Indications:**

It is suitable for peptic ulcer (stomach, duodenum), anti-epidemic esophagitis, and Zollinger-Ellison Syndrome (Gastrinoma).

**Dosage:**

- Oral, not chewable.
- peptic ulcer: a 20mg, 1~2 times a day.
- Reflux esophagitis: 20 ~ 60 mg a time, 1~2 times a day.
- Zollinger-Ellison Syndrome: 60mg, once a day, the daily total dose can be adjusted to 20 ~ 120mg according to the disease, a single dose should not exceed 80mg.

**Contraindications:**

- Patients who are allergic to this drug or have severe renal insufficiency.
- infants should not use this product.

**Warning:**

- When treating gastric ulcer, the possibility of ulcerative gastric cancer should be ruled out first, because the treatment with this product can reduce its symptoms, thus delaying the treatment.
- take care not to chew.
- special groups of medication: infants, pregnant women prohibited; Lactating women with caution; Children and the elderly should strictly follow the doctor's advice.

**Adverse Effects:**

- Common adverse effects: headache, diarrhea, nausea, vomiting, constipation, abdominal pain and bloating.
- Occasionally, dizziness, lethargy, fatigue, sleep disturbance, paresthesia, rash, pruritus, urticaria, abnormal liver function test, etc.
- Rare adverse effects: hyperhidrosis, peripheral angioedema, hyponatremia.

**Dosage form:** White purple Capsules

**Expiry data:** 36 months from the date of manufacture.

**Packaging:** 10 capsules/blister, 50 blisters/box.

**Storage:**

- Protected from light, sealed, and stored at no more than 30 °C.
- Keep out of reach of children.

**Manufactured by:**

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051.

[www.alliancepharmagroup.com](http://www.alliancepharmagroup.com)

## ເອກະສານກຳກັບຢາ OMIRAZO

**ຊື່ທົ່ວໄປ:** Omeprazole

**ຊື່ຜະລິດຕະພັນ:** OMIRAZO

**ສ່ວນປະກອບ:** Omeprazole.....20mg

### ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ນ້ອຍ, ປິ່ນປົວອາການ ເຈັບແສບໃນກະເພາະ ຍ້ອນກົດໄຫຼຍ້ອນ, ປິ່ນປົວອາການຈຸກສຽບແໜ້ນທ້ອງ ຫຼັງຮັບປະທານອາຫານ, ປິ່ນປົວອາການຫຼັງຂອງກົດໃນກະເພາະຫຼາຍເກີນໄປ ໃນກຸ່ມອາການຂອງ Zollinger-Ellison Syndrome (Gastrinoma).

### ວິທີໃຊ້:

ໃຊ້ຕາມການແນະນຳຂອງແພດ ຫຼື ເພສັດຊະກອນ

- ໃຊ້ກິນກິນ, ບໍ່ຄວນຫຍ້າ ຫຼື ຄູ້ວ.
- ປິ່ນປົວບາດແຜໃນກະເພາະ: ເລີ່ມຕົ້ນກິນ 20mg, ຮັບປະທານ 1 ຫາ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ.
- ປິ່ນປົວອາການກົດໄຫຼຍ້ອນ: ໃຊ້ຮັບປະທານ 20 ~ 60 mg ຕໍ່ຄັ້ງ, ຮັບປະທານ 1 ຫາ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ວັນ.
- ປິ່ນປົວອາການ Zollinger-Ellison Syndrome: ໃຊ້ຮັບປະທານ 60mg, ຮັບປະທານຄັ້ງດຽວຕໍ່ວັນ, ສາມາດປັບປະລິມານໃນການໃຊ້ຮັບປະທານໄດ້ ເລີ່ມຈາກ 20 ~ 120mg ຕໍ່ວັນ ຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງຄົນເຈັບ, ການຮັບປະທານແຕ່ລະຄັ້ງ ບໍ່ຄວນເກີນ 80mg.

### ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ແຜ່ຢານີ, ຫ້າມໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີສະພາບໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ.
- ຫ້າມໃຊ້ຢານີກັບເດັກນ້ອຍ.

### ຄຳເຕືອນ:

- ການໃຊ້ຢານີ ຮ່ວມກັບຢາປິ່ນປົວມະເຮັງໃນກະເພາະ ອາດເຮັດໃຫ້ຜົນການປິ່ນປົວຊ້າລົງ.
- ຄວນລະວັງໃນການນຳໃຊ້ຢານີ ໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດ ຕັບ, ຫົວໃຈ, ກະດູກຜຸ່ນ, ພະຍາດປ່າໝູ ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາແມກນີຊຽມໃນເລືອດຕ່ຳ, ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການເຈັບແສບໃນກະເພາະຊ້າເຮືອດິນເກີນສາມເດືອນ
- ຫ້າມໃຊ້ຢານີໃນເດັກ, ຍິງຖືພາ, ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ການໃຊ້ຢານີໃນເດັກ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ຕ້ອງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດຈາກທ່ານໝໍ.

### ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບມີ: ປວດຫົວ, ຖອກທ້ອງ, ຮາກ, ເມືອຍ, ວິນວຽນ, ທ້ອງຜູກ, ເຈັບທ້ອງ, ທ້ອງອິດ.
- ບາງຄັ້ງພົບມີ: ອາການວິນຫົວ, ງ່ວງນອນ, ອ່ອນເພຍ, ນອນບໍ່ຫຼັບ ມືນຊາ, ຜິວຫນັງເປັນຜົນ ຄັນຄາຍ ກວດພົບຫນ້າທີ່ການທ່າງານຂອງຕັບຜິດປົກກະຕິອື່ນໆ.
- ອາການທີ່ບໍ່ມັກພົບ: hyperhidrosis, peripheral angioedema, hyponatremia.

**ຮູບແບບຂອງຢາ:** ເປັນແຄັບຊູນສີຂາວມ້ວງ.

**ວັນຫມົດອາຍຸ:** 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນຜະລິດ.

**ຂະໜາດບັນຈຸທຸ້ມຫໍ່:** 1 ແຜງ ມີ 10 ແຄັບຊູນ, 1 ກັບມີ 50 ແຜງ.

### ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງເຕີມ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງຕ່ຳກວ່າ 30°C.
- ເກັບຮັກສາຢາ ຫ່າງຈາກມືເດັກ.

### ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051.

www.alliancepharmagroup.com