

ORSERDU

Generic Name: Elacestrant tablets

Brand Name: ORSERDU

Composition:

Elacestrant.....345mg

Indications:

- ORSERDU is indicated for the treatment of postmenopausal women or adult men with estrogen receptor (ER)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, ESR1-mutated advanced or metastatic breast cancer with disease progression following at least one line of endocrine therapy.

Dosage:

- The recommended dosage of ORSERDU is one 345 mg tablet taken orally, once daily, with food.
- Dose interruption, reduction, or permanent discontinuation may be required due to adverse reactions.

Contraindication:

- Contraindications include factors that may increase the risk of side effects (eg, hypertension or concomitant use of certain drugs) and therefore is not usually recommended for treatment.

Warning:

- **Dyslipidemia:** ORSERDU may cause hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia. Monitor lipid profile prior to starting treatment and periodically thereafter.
- **Embryo-Fetal Toxicity:** ORSERDU can cause fetal harm. Advise of the potential risk to a fetus and to use effective contraception.

Adverse effects:

- The most common (>10%) adverse reactions, including laboratory abnormalities, of ORSERDU were musculoskeletal pain, nausea, increased cholesterol, increased AST, increased triglycerides, fatigue, decreased hemoglobin, vomiting, increased ALT, decreased sodium, increased creatinine, decreased appetite, diarrhea, headache, constipation, abdominal pain, hot flush, and dyspepsia.

Dosage form: Light blue tablets

Expiry date: 24 months after the date of manufacture

Packaging: 30 tablets per bottle

Storage:

- Protected from light, sealed in original packaging, and stored at 20 - 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ ORSERDU

ຊື່ທົດໄປ: Elacestrant tablets

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: ORSERDU

ສ່ວນປະກອບ:

Elacestrant 345mg

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ORSERDU ນຳໃຊ້ສຳລັບການປິ່ນປົວໃນແມ່ຍິງທີ່ໝົດປະຈຳເດືອນ ຫຼື ທ່ານຊາຍທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີມະເຮັງເຖົ້າມີມະເຮັງແຜ່ລາມ ຫຼື ແຜ່ກະຈາຍໂດຍກວດພົບວ່າ ມີຕົວຮັບເອສໂຕຣເຈນ ER ເປັນຜົນບວກ (estrogen receptor (ER)-positive), ປັດໃຈຂອງຕົວຮັບ ເອປີເດີມໂ ໂຄຣດ ປະເພດ 2 HER2 ເປັນລົບ (human epidermal growth factor receptor 2-negative) ຊຶ່ງແມ່ນໂປຣເຕອິນ ທີ່ຄວບຄຸມຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການແບ່ງຕົວຂອງຈຸລັງ, ມະເຮັງເຖົ້າມີມະເຮັງແຜ່ລາມ ທີ່ມີການກາຍພັນຂອງ ESR1 ຮ່ວມກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການບຳບັດດ້ວຍຮໍໂມນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຮອບຂອງການປິ່ນປົວ.

ວິທີໃຊ້:

- ໃຊ້ ORSERDU ໃນປະລິມານ 345 mg ດ້ວຍການຮັບປະທານທາງປາກ ໜຶ່ງເທື່ອ ຕໍ່ມື້ ພ້ອມອາຫານ.
- ຖ້າພົບເຫັນປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄວາມຢາ, ພົບເຫັນອາການຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເກີດອາການແຜ່ໃດໆ ໃນໄລຍະການນຳໃຊ້ ແມ່ນໃຫ້ປຶກສາແພດ, ອາດຈະຫຼຸດປະລິມານຢາ ຫລື ຢຸດການໃຊ້ຢາເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ການໃຊ້ຢາມີອາດພາໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເກີດຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນເວລາໃຊ້ຢາ ຫຼື ໃນເວລາໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາປະເພດຕ່າງໆ, ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການແນະນຳ, ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ຫ້າມໃນການນຳໃຊ້.

ຄຳເຕືອນ:

- ໃຫ້ລະມັດລະວັງການນຳໃຊ້ຢາມີໃນຄົນເຈັບຫຼືມີບັນຫາກ່ຽວກັບໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ (Dyslipidemia): ORSERDU ອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດທາດໄຂມັນໃນເລືອດສູງ (hypercholesterolemia) ລວມທັງປະລິມານຂອງຕຣີກລີເຊໂຣສູງໃນເລືອດ(hypertriglyceridemia). ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນໃຫ້ມີການກວດໄຂມັນໃນເລືອດ ໄລຍະກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການນຳໃຊ້, ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງການປ່ຽນແປງໄຂມັນໃນເລືອດ.
- ການໃຊ້ຢາມີ ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ພົບເຫັນອາການຕ່າງໆ ຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ: ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນໃຊ້ ORSERDU ຄວນກວດໃຫ້ແນ່ໃຈ ວ່າບໍ່ໄດ້ຖືພາ ຫຼື ມີການວາງແຜນຄອບຄົວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ຜົນຂ້າງຄວາມ:

- ບັນດາຜົນຂ້າງຄວາມ ສ່ວນຫລາຍ ພົບວ່າ: ມີອາການປວດທີ່ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ກະດູກ, ອ່ອນເພຍ, ປັນປ່ວນລະບົບລະລາຍ, ບໍ່ຢາກກິນອາຫານ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ເຈັບຫ້ອງ, ປຸ້ນຫ້ອງ, ຮາກ, ຫ້ອງຜູກ, ເຈັບຫົວ, ອອກຮ້ອນຈຸບວາບ, ລວມທັງຜົນການກວດເລືອດປະມານ (>10%) ພົບເຫັນໜ້າທີ່ການທ່າງານຂອງຕັບ AST, ALT ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະລິມານຕຣີກລີເຊໂຣ (Triglycerides) ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮໂມໂກບິນ (Hemoglobine) ຫຼຸດລົງ, ໂຊດຽມ (Sodium) ຫຼຸດລົງ, ແລະ ຄຣີເອຕີນິນ (Creatinine) ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຢາເມັດສີຟ້າອ່ອນ

ວັນໝົດອາຍ: 24 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ; 1 ກ່ອງມີ 30 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກັບກ່ອງ ບັນຈຸເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີ ອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 20°C-25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຽບ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com