

OSILOSIS

Generic name: Osilodrostat

Brand name: OSILOSIS

Composition : Osilodrostat..... 1mg

Indications:

- OSILOSIS is a cortisol synthesis inhibitor indicated for the treatment of adult patients with Cushing's disease for whom pituitary surgery is not an option or has not been curative

Dosage:

- Correct hypokalemia and hypomagnesemia, and obtain baseline electrocardiogram prior to starting OSILOSIS.
- Initiate dosage at 2 mg orally twice daily, with or without food.
- Titrate dosage by 1 to 2 mg twice daily, no more frequently than every 2 weeks based on rate of cortisol changes, individual tolerability and improvement in signs and symptoms.
- Maximum recommended dosage is 30 mg twice daily.
- Patients with Hepatic Impairment:
 - Child-Pugh B: Recommended starting dose is 1 mg twice daily.
 - Child-Pugh C: Recommended starting dose is 1 mg once daily in the evening.

Contraindications:

- None.

Warning:

- Hypocortisolism: Monitor patients closely for hypocortisolism and potentially life-threatening adrenal insufficiency. Dosage reduction or interruption may be necessary.
- QTc Prolongation: Perform electrocardiogram in all patients Use with caution in patients with risk factors for QTc prolongation.
- Elevations in Adrenal Hormone Precursors and Androgens: Monitor for hypokalemia, worsening of hypertension, edema, and hirsutism.

Adverse Effects:

- Common adverse reactions are adrenal insufficiency, fatigue, nausea, headache, QT prolongation and edema.

Dosage form: Pale yellow tablet.

Packaging: 60 tablets per bottle.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Storage:

- Store in original packaging at protected from moisture between 20°C to 25°C.
- Keep out of reach of children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ OSILOSIS

ຊື່ທົ່ວໄປ: Osilodrostat

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: OSILOSIS

ສ່ວນປະກອບ : Osilodrostat..... 1mg

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- OSILOSIS ນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວ ພະຍາດຊິນປິງໃຕ້ສະຫມອງ ຫລື Cushing's ໃນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີວິທີການປິ່ນປົວແນ່ນອນ ຫລື ບໍ່ສາມາດທຳການຜ່າຕັດໄດ້, ກິນໂກການອອກລິດຂອງຢາ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີການທຳງານຂອງອົງຊີມທີ່ທຳການສັງເຄາະ Cortisol ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງຊິນປິງຫຼຸດລົງ.

ວິທີໃຊ້:

- ກ່ອນການເລີ່ມໃຫ້ຢາ ຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຢັ້ງຢືນ ລະດັບຂອງ ໂປຕັດຊຽມ ແລະ ມາເຢຊຽມໃນເລືອດ ລວມທັງການວັດແທກຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ ຮັບປະກັນວ່າຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິເສຍກ່ອນ.
- ເລີ່ມຖືກດ້ວຍການໃຫ້ກິນຢາໃນປະລິມານ 2mg, 2 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ, ສາມາດກິນຢາຝອມກັບເວລາອາຫານ ຫລື ຫລັງອາຫານກໍໄດ້.
- ຕໍ່ມາໃຫ້ປັບຂະໜາດ ຢາລົງ ໃນລະດັບ 1 - 2mg ກິນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ ແລະ ລະດັບບໍ່ຄວນໃຊ້ເກີນ 2 ອາທິດຂຶ້ນກັບປະລິມານ ການປ່ຽນແປງຂອງ Cortisol ທີ່ກວດພົບ, ຂຶ້ນກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ການຮັບໄດ້ຂອງຄົນເຈັບ.
- ປະລິມານສູງສຸດຂອງຢາທີ່ສາມາດຮອງຮັບໃນການນຳໃຊ້ ແມ່ນ 30 mg, 2 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ. ການຕັດປັບປະລິມານການໃຊ້ຢາ ຍັງຂຶ້ນກັບຜົນຂອງການວິເຄາະທາງຫ້ອງແລັບ
- ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາໃນການທຳງານຂອງຕັບ:
 - ກໍລະນີ ລະດັບການຊຸດໂຊມຂອງຕັບ ຢູ່ໃນລະດັບ ຊາຍຟິວ ບີ (Child-Pugh B): ຄວນໃຊ້ເລີ່ມຕົ້ນ ໃນປະລິມານ 1mg, 2 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ.
 - ກໍລະນີ ລະດັບການຊຸດໂຊມຂອງຕັບ ຢູ່ໃນລະດັບ ຊາຍຟິວ ຊີ (Child-Pugh C): ຄວນໃຊ້ເລີ່ມຕົ້ນ ໃນປະລິມານ 1mg ໃຫ້ວັນລະຄັ້ງ ໃນຕອນແລງ.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ຫ້າມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທື່ອ.

ຄຳເຕືອນ:

- ໃນເວລາການນຳໃຊ້ຢານີ້ ຄວນມີການກວດຕິດຕາມ ລະດັບຂອງ Cortisol ການໃຊ້ຢານີ້ ອາດພາໃຫ້ເກີດປະລິມານຂອງ Cortisol ຕ່ຳ (Hypocortisolism) ເຊິ່ງສາມາດພາໃຫ້ ເສຍຊີວິດໄດ້ ຖ້າພົບເຫັນ Hypocortisolism ຄວນຫຼຸດປະລິມານ ຫລື ລະງັບການນຳໃຊ້ຢານີ້.
- ຄວນມີການກວດວັດແທກຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ ໃນເວລານຳໃຊ້, ລິດຂອງຢາ ສາມາດພາໃຫ້ເກີດ ຄື້ນຫົວໃຈ QTc ທີ່ແກ່ຍາວ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເປັນຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ການທຳງານຂອງຫົວໃຈໄດ້.
- ຕິດຕາມ ລະດັບການທຳງານຜິດປົກກະຕິ ຂອງສ່ວນຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫລັງ ລວມທັງສານ Androgens ເຊັ່ນ: ການກວດຕິດຕາມລະດັບ ໂປຕັດຊຽມ (ເພື່ອຕິດຕາມ Hypokalemia), ບັນຫາຄວາມດັນເລືອດສູງ, ການເກີດອາການບວມ ແລະ ການເກີດ ຂົນປົງຜິດປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ບັນດາຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບ ປະກອບມີ: ການທຳງານຂອງຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫລັງ ທຳງານບໍ່ພຽງພໍ, ອ່ອນເພຍ, ປຸ້ນທ້ອງ, ປວດຫົວ, ພົບການບວມ.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ເປັນເມັດກົມ ມີຂອບ ນູນສອງດ້ານ ຢາເມັດສີເຫລືອງອ່ອນ

ວັນຫມົດອາຍຸ: 36 ເດືອນ ນັບຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກ່ອງ, 1 ກ່ອງມີ 60 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໃນກັບກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ຮັກສາຢາບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມໃນລະຫວ່າງ 20°C ຫາ 25°C.
- ເກັບຮັກສາຢາໃຫ້ຫ່າງຈາກມືເດັກ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com