

ເອກະສານກຳກັບຢາ PARATAMOL

ຊື່ທົ່ວໄປ: Paracetamol

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: PARATAMOL

ສ່ວນປະກອບ: Paracetamol.....500mg.

ຂໍ້ບົງໃຊ້:

- ແກ້ປວດ / ໝູດໄຂ້ ສຳລັບປົນປົວອາການປວດເລັກນ້ອຍ ຫຼື ມີໄຂ້.

ວິທີໃຊ້:

- ຜູ້ໃຫຍ່ ກິນ 1 ຫາ 2 ເມັດ, 3 ຫຼື 4 ຄັ້ງ/ມື້, ຖ້າກໍລະນີຈຳເປັນສູງສຸດບໍ່ຄວນເກີນ 8 ເມັດ/ມື້.

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຕັບແຂງ ແລະ ຕ່ອມໝາກໄຂ້ຫຼັງຮ້າຍແຮງແມ່ນຫ້າມໃຊ້.
- ຜູ້ທີ່ແຜ່ຢານີແມ່ນຫ້າມໃຊ້.

ຄຳເຕືອນ:

- ຫ້າມໃຊ້ເປັນຢາລົດໄຂ້ເກີນ 3 ມື້.
- ຫ້າມໃຊ້ເປັນຢາແກ້ປວດເກີນ 5 ມື້.
- ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.
- ຢ່າດື່ມເຫຼົ້າໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢານີຢູ່.
- ຫ້າມນຳໃຊ້ໃນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ.
- ຖ້າໃຊ້ຢາອື່ນໆຢູ່ ໃຫ້ປຶກສາທ່ານໝໍກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢານີ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເຫັນໜ້ອຍປະກອບມີ: ຜືນ, ພະຍາດລົມພິດ, ອາການໄຂ້ຂຶ້ນຈາກລົດຢາ ຫຼື ເມັດເລືອດຂາວຕ່ຳ.
- ຜົນຂ້າງຄຽງໄລຍະຍາວ ມີຄື: ຖ້າໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໝາກໄຂ້ຫຼັງ ຫຼື ຕັບ.

ຮູບແບບ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນທີອາຍຸ: 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸໃນກັບ, 1 ກັບມີ 50 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ຄວນເກັບໄວ້ໃຫ້ຫ່າງຈາກມືເດັກ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກແສງແດດ ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນບ່ອນແຫ້ງທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 25°C.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣຸບ ຈຳກັດ.

ເຂດພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

PARATAMOL

Generic name: Paracetamol

Brand name: Paratamol

Composition: Paracetamol.....500mg.

Indication:

- Analgesic/ antipyretic for the treatment of mild pain or fever.

Dosage:

- Adult: 1 to 2 tablets, 3 or 4 times daily, if necessary (max 8 tablets daily)

Contraindications:

- Patients with severe hepatic and renal impairment are contraindicated.
- Those who are allergic to this product are contraindicated.

Warning:

- Do not use as an antipyretic for more than 3 days.
- Do not use as an analgesic for more than 5 days.
- Pregnant and lactating women should use with caution.
- Do not drink alcohol while using this product.
- Children under 12 years should not take a whole tablet.
- If using other medication, please consult your physician before using this product.

Adverse effects:

- Rare side effects may include: rash, urticaria, drug fever or neutropenia.
- Long term, excessive use may lead to kidney and/or liver damage.

Dosage form: White tablet

Expiry date: 36 months after date of manufacture.

Packaging: 10 tablets per blister pack, 50 blister packs per box.

Storage:

- Keep away from children and direct sunlight in a dry place below 25°C.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com