

Sodium Chloride 0.9

Generic name: Sodium Chloride Injection

Brand Name: Sodium Chloride 0.9

Composition:

Sodium chloride 100ml : 0.9g

Indications:

- Sodium Chloride 0.9% injection is used to replenish fluids and electrolytes, especially when these are lost due to dehydration, vomiting, diarrhea, or excessive sweating.
- It acts as a carrier fluid for administering other medications intravenously, ensuring proper dilution and distribution.
- Used to clean nasal passages, and eye and Wash the external wound etc.

Dosage:

Intravenous (IV) Fluid Replacement / Hydration

Used for dehydration, electrolyte loss

- **Adults:**
 - Initial dose: 500 mL to 1000 mL IV infusion.
 - Maintenance: Typically, 1.5 to 3 liters/day, depending on fluid needs.
- **Children:**
 - Maintenance fluid: Approx. 100 mL/kg/day (divided over 24 hours).
 - Adjust according to age, weight, and clinical status.
- **As a Diluent or Carrier for IV Medications**
 - Amount varies depending on the medication.
 - Usually, 50 mL to 250 mL used to dilute drugs like antibiotics, chemotherapy, etc.
- **Nasal Irrigation**
 - Used for clearing nasal passages in colds or allergies.
- **Eye wash:**
 - 1–2 drops as needed or irrigate gently for a few minutes with continuous flow.
- **Wound Cleaning Used externally:**
 - Wound irrigation: Use as needed to flush the wound no strict dosage (e.g., 50–100 mL or more).

Contraindications:

- None.

Warning:

- Use with caution in patients with edematous diseases, hypertension, and hypokalemia.

Adverse Effects:

- Too much and too fast infusion can lead to water and sodium retention, edema, high blood pressure, fast heart rate, chest tightness, dyspnea, and even acute left heart failure.

Dosage form: This product is Injection, colourless clear liquid.

Expiry date: 36 months from the date of manufacture.

Packaging: 100ml/Bag, 40 Bags/Box.

Storage:

- Sealed, stored at no more than 30 °C.

Manufactured by:

Alliance Pharmaceutical Co., Ltd

Simanoneua Village, Hadxayfong District, Vientiane, Lao PDR

Tel: +856-21-612 727

www.alliancepharmagroup.com

ເອກະສານກຳກັບຢາ

Sodium Chloride 0.9

ຊື່ທົດໄປ: Sodium Chloride Injection

ຊື່ການຄ້າ: Sodium Chloride 0.9

ສ່ວນປະກອບ:

Sodium chloride.....100ml : 0.9g

ຂໍ້ບັງໃຊ້:

- Sodium Chloride 0.9% ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອທົດແທນນ້ຳ ແລະ ທາດອີເລັກໂທຣໄລ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ສູນເສຍນ້ຳໄປຍ້ອນການຂາດນ້ຳ, ຮາກ, ຖອກທ້ອງ ຫຼື ເຫືອອອກຫຼາຍເກີນໄປ.
- ໃຊ້ເພື່ອເຈືອຈາງຢາ ແລະ ລະລາຍຢາຕ່າງໆທີ່ຈະສົດເຂົ້າເສັ້ນເລືອດໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ.
- ໃຊ້ເພື່ອລ້າງຮູດັງ, ຕາ ແລະ ລ້າງບາດແຜພາຍນອກ ແລະ ອື່ນໆ.

ວິທີໃຊ້:

ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນນ້ຳ ແລະ ທາດອີເລັກໂທຣໄລ

- **ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່:**
 - **ປະລິມານຢາເລີ່ມຕົ້ນ:** ໃຫ້ສານນ້ຳທາງເສັ້ນເລືອດ 500ml ຫາ 1,000ml.
 - **ປະລິມານຢາສຳລັບການຮັກສາ:** ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 1.5 ຫາ 3 ລິດ/ມື້ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຮ່າງກາຍ.
- **ສຳລັບເດັກນ້ອຍ:**
 - **ປະລິມານຢາສຳລັບການຮັກສາ:** ປະມານ 100ml/kg/ມື້ (ແບ່ງພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ).
 - **ການປັບປະລິມານ:** ໃຫ້ປັບຕາມອາຍຸ, ນ້ຳໜັກ ແລະ ອາການທາງຄລິນິກ.
- **ສຳລັບໃຊ້ເປັນສານລະລາຍ ຫຼື ສານນຳພາສຳລັບສົດຢາເຂົ້າເສັ້ນເລືອດ:**
 - ປະລິມານການໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດຂອງຢາ.
 - ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ 50ml ຫາ 250ml ເພື່ອລະລາຍຢາເຊັ່ນ: ຢາຕ້ານເຊື້ອ, ຢາເຄມີບຳບັດ ແລະ ອື່ນໆ.
- **ການລ້າງດັງ:**
 - ໃຊ້ເພື່ອລ້າງທຳຄວາມສະອາດໃນຮູດັງ ເວລາເປັນຫວັດ ຫຼື ມີອາການແຜ່.
- **ການລ້າງຕາ:**
 - ໃຊ້ 1-2 ຢອດຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ລ້າງຄ່ອຍໆເປັນເວລາ 2-3 ນາທີ ດ້ວຍການໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຕໍ່ເນື່ອງ.
- **ການທຳຄວາມສະອາດບາດແຜພາຍນອກ:**
 - ການລ້າງບາດແຜ: ໃຊ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອລ້າງສິ່ງປົນເປື້ອນອອກຈາກບາດແຜ, ບໍ່ມີປະລິມານທີ່ກຳນົດໄວ້ (ຕົວຢ່າງ: ໃຊ້ 50-100ml ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ).

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້:

- ບໍ່ມີ.

ຄຳເຕືອນ:

- ນຳໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການບວມນ້ຳ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ພາວະຮ່າງກາຍມີທາດໂປຕັດຊຽມໃນເລືອດຕ່ຳ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ການສັກສິ່ງຢາຫຼາຍ ແລະ ໄວເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີພາວະອັງກິດ ແລະ ທາດເກືອໂຊດຽມ, ອາການບວມນ້ຳ, ຄວາມດັນ ເລືອດສູງ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ຫາຍໃຈຍາກ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນພາໃ້ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວກະທັນຫັນໄດ້.

ຮູບແບບຂອງຢາ: ຜະລິດຕະພັນມີລັກສະນະເປັນຂອງແຫຼວ, ໃສ, ບໍ່ມີສີ, ສຳລັບສັກສິ່ງ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: 1 ແກັດມີ 40 ຖົງ, 1 ຖົງມີ 100ml.

ວັນທີມີອາຍຸ: 36 ເດືອນ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ຜະລິດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸເດີມ, ປິດສະໝິດ, ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ 30°C.

ຜະລິດໂດຍ:

ບໍລິສັດ ພັນທະມິດຟາມາຊຸຕິຄໍາ ຈຳກັດ

ສະຖານທີ່: ບ້ານ ສີມມະໂນເໝືອ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21-612 727

www.alliancepharmagroup.com