

ເອກະສານກຳກັບຢາ TROMBO

ຊື່ທົວໄປ: Avatrombopag Maleate

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: Trombo

ສ່ວນປະກອບ:

Avatrombopag Maleate.....20mg

ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

Trombo ແມ່ນຕົວເລັງປະຕິກິລິຍາຕົວຮັບ Thrombopoietin ເພາະສຳລັບການປົນປົງ:

- ພາວະເມັດເລືອດນ້ອຍຕໍ່າໃນຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນພະຍາດຕັບຊຳເຮືອທີ່ກຳລັງວາງແຜນການຜ່າຕັດ
- ພາວະເມັດເລືອດນ້ອຍຕໍ່າໃນຄົນເຈັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນປົກຄອງຊຳເຮືອທີ່ມີການຕອບສະໜອງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການປົນປົງກ່ອນໜ້ານີ້.

ວິທີໃຊ້:

- ກິນພ້ອມອາຫານ.
- ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດຕັບຊຳເຮືອ: ປະລິມານຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນເມັດເລືອດນ້ອຍ (ເບິ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ), ການກິນຢາຄວນເລີ່ມກ່ອນການຜ່າຕັດ 10-13 ວັນ, ຄົນເຈັບຄວນໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ 5-8 ວັນຫຼັງຈາກກິນຢາ Trombo ຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

ຈຳນວນເມັດເລືອດນ້ອຍ ($\times 10^9$ /L)	ປະລິມານ 1 ຄັ້ງ/ມື້	ໄລຍະເວລາຂອງການກິນຢາ
≤ 40	60mg (ກິນ 3 ເມັດ (20mg))	5 ວັນ
≥ 40 ເຖິງ ≤ 50	40mg (ກິນ 2 ເມັດ (20mg))	5 ວັນ

- ພາວະເມັດເລືອດນ້ອຍຕໍ່າໃນຄົນເຈັບທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນປົກຄອງຊຳເຮືອ ຄວນເລີ່ມກິນຢາໃນປະລິມານ 1 ເມັດ (20mg) 1ຄັ້ງ/ມື້, ປັບອັດຕາການກິນຢາ ຫຼື ຄວາມຖີ່ໃນການກິນຢາເພື່ອຮັກສາຈຳນວນເມັດເລືອດນ້ອຍໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 50×10^9 / L ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກິນເກີນ 2 ເມັດ (40mg)/ມື້ ຫຼື ກິນຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ.

ຂັ້ນຕອນໃຊ້:

- ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່

ຄຳເຕືອນ:

- ເມັດເລືອດນ້ອຍອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ / ພາວະແຊກຊ້ອນຂອງເມັດເລືອດນ້ອຍອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ: Trombo ແມ່ນຕົວເລັງປະຕິກິລິຍາຕົວຮັບ Thrombopoietin , ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບພາວະແຊກຊ້ອນຂອງເມັດເລືອດນ້ອຍອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ເມັດເລືອດນ້ອຍອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດໃນຄົນເຈັບທີ່ມີໂລກຕັບຊຳເຮືອ ຫຼື ພູມຄຸ້ມກັນປົກຄອງຊຳເຮືອ
- ຕິດຕາມກວດກາຈຳນວນເມັດເລືອດນ້ອຍ, ຊອກຫາເຫດການ, ອາການຂອງພາວະເມັດເລືອດນ້ອຍອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ເລີ່ມການຮັກສາໂດຍທັນທີ.
- ການໃຊ້ຢາໃນແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາອາດເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃນຫ້ອງໄດ້ ຫ້າມໃຊ້ໃນແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່.

ຜົນຂ້າງຄຽງ:

- ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຕັບຊຳເຮືອ ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ($\geq 3\%$) ຄື: ມີໄຂ້, ເຈັບຫ້ອງ, ເຈັບຫົວ, ປວດຮາກ, ເມືອຍ ແລະ ບວມໃຄ່.

ຮູບແບບ: ຢາເມັດສີຂາວ.

ວັນທີອາຍຸ: 24 ເດືອນຫຼັງຈາກວັນຜະລິດ.

ຂະໜາດບັນຈຸ: ບັນຈຸ 3 ແຜງ, 1 ແຜງມີ 10 ເມັດ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ເກັບໄວ້ບ່ອນບໍ່ມີແສງແດດ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ 25°C ເກັບໄວ້ຫ່າງໄກຈາກເຕັກ.
- ເກັບໄວ້ໃນແຜງເຕີມ.

ຜະລິດໂດຍ:

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ລາວພັນທະມິດ ຟາກມາ ກຣູບ ຈຳກັດ.

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພັດທະນາກວມລວມ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທລະສັບ: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com

TROMBO

Generic name: Avatrombopag Maleate

Brand name: Trombo

Composition:

Avatrombopag Maleate.....20mg

Indications:

Trombo is a thrombopoietin receptor agonist indicated for the treatment of:

- Thrombocytopenia in adults with chronic liver disease who are planning surgery.
- Thrombocytopenia in adult patients with chronic immune thrombocytopenia who have had an inadequate response to prior therapy.

Dosage:

- Take tablets orally with food.
- Chronic liver disease: Dosage is based on platelet count (see table below) Dosing should begin 10-13 days prior to plan procedure. The patient should undergo their procedure 5-8 days after last dose of Trombo.

Platelet count ($\times 10^9/L$)	Once-daily dose	Duration of dosing
≤ 40	60mg (three 20mg tablets)	5 days
≥ 40 to ≤ 50	40mg (two 20mg tablets)	5 days

- Chronic Immune Thrombocytopenia: start dosing at 20mg (1 tablet) once daily. Adjust dosing or dosing frequency rate to maintain a platelet count greater than or equal to $50 \times 10^9/L$. Do not exceed 40mg a day or follow a physician's advice.

Contraindications:

- Pregnant and Lactating women.

Warnings:

- Thrombotic/ thromboembolic complications: Trombo is a thrombopoietin receptor agonist that has been associated with thrombotic and thromboembolic complications in patients with chronic liver disease or chronic immune thrombocytopenia.
- Monitor platelet counts. Look for signs and symptoms of thromboembolic events and initiate treatment promptly.
- Using this drug during pregnancy may harm the fetus, do not use while breastfeeding.

Adverse effects:

- In patients with chronic liver disease, the most common adverse reactions ($\geq 3\%$) were pyrexia, abdominal pain, nausea, headache, fatigue and peripheral edema.

Dosage form: white tablet.

Expiry date: 24 months after date of manufacture.

Packaging: Contained in 3 blister packs, 10 tablets per blister pack.

Storage:

- Store in the original container.
- Store under 25°C , protected from moisture and direct sunlight away from children.

Manufactured by:

Laos Alliance Pharmaceutical Group Factory.

Saysettha Development Zone, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: +856-21-737 051

www.alliancepharmagroup.com